

13T

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 99P147WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP99/04552	International filing date (day/month/year) 24 August 1999 (24.08.99)	Priority date (day/month/year) 24 August 1998 (24.08.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 5/10, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/08, G01N 33/53, A01K 67/027 // (C12N5/10, C12R 1:91)(C12P 21/02, C12R 1:91)(C12P 21/02, C12R 1:91)		
Applicant FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of _____ sheets.</p>
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input checked="" type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>

Date of submission of the demand 12 January 2000 (12.01.00)	Date of completion of this report 13 September 2000 (13.09.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.



## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/04552

**I. Basis of the report****1. With regard to the elements of the international application:\***

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

**2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.**

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

**3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:**

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☒ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☒ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

**4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:**

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

**5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\***

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.





# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/JP99/04552

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-37	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-37	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-37	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Document 1: Eur. J. Immunol. Vol. 22, 1992, pages 1437-1445

Document 2: Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 191, No. 2, 1993, pages 335-342

Document 3: JP, 9-238683, A (Eijin Kenkyusho K.K.) 16 September 1997 (16.09.97)

The inventions described in Claims 1-37 appear to involve an inventive step with respect to documents 1-3 cited in the international search report. Documents 1-3 do not describe a polynucleotide, probe, vector, or transformant (including non-human transgenic animals) containing the base sequence described in Sequence No. 1 or a base sequence that codes for the protein comprising the amino acid sequence described in Sequence No. 2, that protein, an antibody to that protein, or a screening method for that protein, and persons skilled in the art cannot easily conceive of these matters based on the descriptions in documents 1-3.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/JP99/04552

## VI. Certain documents cited

### 1. Certain published documents (Rule 70.10)

<u>Application No. Patent No.</u>	<u>Publication date (day/month/year)</u>	<u>Filing date (day/month/year)</u>	<u>Priority date (valid claim) (day/month/year)</u>
PCT/US98/1210	10 December 1998 (10.12.1998)	01 June 1998 (01.06.1998)	04 June 1997 (04.06.1997) 29.05.98

### 2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

<u>Kind of non-written disclosure</u>	<u>Date of non-written disclosure (day/month/year)</u>	<u>Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)</u>



特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人  角田 嘉宏  殿  あて名  〒 650-0031  兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル3階 有古特許事務所
---

PCT

国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨  
の決定の送付の通知書

(法施行規則第41条)  
〔PCT規則44.1〕

発送日  
(日.月.年)

14.12.99

出願人又は代理人 の書類記号 99P147WO	今後の手続きについては、下記1及び4を参照。
国際出願番号 PCT/J P99/04552	国際出願日 (日.月.年) 24.08.99
出願人 (氏名又は名称) 扶桑薬品工業株式会社	

- ☒ 国際調査報告が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。  
PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出  
出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる（PCT規則46参照）。  
いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。  
詳細については添付用紙の備考を参照すること。  
どこへ 直接次の場所へ  
The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland  
Facsimile No.: (41-22)740-14.35  
詳細な手続については、添付用紙の備考を参照すること。
- ☐ 国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項（PCT17条(2)(a)）の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- ☐ 法施行規則第44条（PCT規則40.2）に規定する追加手数料の納付に対する異議の申立てに関して、出願人に下記の点を通知する。  
☐ 異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申し立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。  
☐ 当該異議についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。
- 今後の手続： 出願人は次の点に注意すること。  
優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むときは、国際公開又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2.1及び90の2.3にそれぞれ規定されているように、国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。  
出願人が優先日から30月まで（官庁によってはもっと遅く）国内段階の開始を延期することを望むときは、優先日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。  
国際予備審査の請求書若しくは、後にする選択により優先日から19箇月以内に選択しなかった又は第II章に拘束されないため選択できなかったすべての指定官庁に対しては優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定手続を取らなければならない。

名称及びあて名 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	権限のある職員 特 許 庁 長 官  電話番号 03-3581-1101 内線 3448	4B 8931
---	---	---------



## 様式PCT/ISA/220の備考

この備考は、PCT 19条の規定に基づく補正書の提出に関する基本的な指示を与えるためのものである。この備考は特許協力条約並びにこの条約に基づく規則及び実施細則の規定に基づいている。この備考とそれらの規定とが相違する場合には、後者が適用される。詳細な情報については、WIPOの出版物であるPCT出願人の手引も参照すること。

### PCT 19条の規定に基づく補正書の提出に関する指示

出願人は、国際調査報告を受領した後、国際出願の請求の範囲を補正する機会が一回ある。しかし、国際出願のすべての部分（請求の範囲、明細書及び図面）が、国際予備審査の手続においても補正できるもので、例えば出願人が仮保護のために補正書を公開することを希望する場合又は国際公開前に請求の範囲を補正する別の理由がある場合を除き、通常PCT 19条の規定に基づく補正書を提出する必要はないことを強調しておく。さらに、仮保護は一部の国のみで与えられるだけであることも強調しておく。

#### 補正の対象となるもの

PCT 19条の規定により請求の範囲のみ補正することができる。

国際段階においてPCT 34条の規定に基づく国際予備審査の手続において請求の範囲を（更に）補正することができる。

明細書及び図面は、PCT 34条の規定に基づく国際予備審査の手続においてのみ補正することができる。

国内段階に移行する際、PCT 28条（又はPCT 41条）の規定により、国際出願のすべての部分を補正することができる。

#### いつ

国際調査報告の送付の日から2月又は優先日から16月の内どちらか遅く満了するほうの期間内。しかし、その期間の満了後であっても国際公開の技術的な準備の完了前に国際事務局が補正を受領した場合には、その補正書は、期間内に受理されたものとみなすことを強調しておく（PCT規則46.1）。

#### 補正書を提出すべきところ

補正書は、国際事務局のみに提出でき、受理官庁又は国際調査機関には提出してはいけない（PCT規則46.2）。国際予備審査の請求書を提出した／する場合については、以下を参照すること。

#### どのように

1以上の請求の範囲の削除、1以上の新たな請求の範囲の追加、又は1以上の請求の範囲の記載の補正による。

差替え用紙は、補正の結果、出願当初の用紙と相違する請求の範囲の各用紙毎に提出する。

差替え用紙に記載されているすべての請求の範囲には、アラビア数字を付さなければならない。請求の範囲を削除する場合、その他の請求の範囲の番号を付け直す必要はない。請求の範囲の番号を付け直す場合には、連続番号で付け直さなければならない（PCT実施細則第205号(b)）。

補正は国際公開の言語で行う。

#### 補正書にどのような書類を添付しなければならないか

##### 書簡（PCT実施細則第205号(b)）

補正書には書簡を添付しなければならない。

書簡は国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開されることはない。これを「PCT 19条(1)に規定する説明書」と混同してはならない（「PCT 19条(1)に規定する説明書」については、以下を参照）。

書簡は、英語又は仏語を選択しなければならない。ただし、国際出願の言語が英語の場合、書簡は英語で、仏語の場合、書簡は仏語で記載しなければならない。

書簡には、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違について表示しなければならない。特に、国際出願に記載した各請求の範囲との関連で次の表示（2以上の請求の範囲についての同一の表示する場合は、まとめることができる。）をしなければならない。

- (i) この請求の範囲は変更しない。
- (ii) この請求の範囲は削除する。
- (iii) この請求の範囲は追加である。
- (iv) この請求の範囲は出願時の1以上の請求の範囲と差し替える。
- (v) この請求の範囲は出願時の請求の範囲の分割の結果である。





次に、添付する書簡中での、補正についての説明の例を示す。

1. [請求の範囲の一部の補正によって請求の範囲の項数が48から51になった場合] :  
“請求の範囲1-29、31、32、34、35、37-48項は、同じ番号のもとに補正された請求の範囲と置き換えられた。請求の範囲30、33及び36項は変更なし。新たに請求の範囲49-51項が追加された。”
2. [請求の範囲の全部の補正によって請求の範囲の項数が15から11になった場合] :  
“請求の範囲1-15項は、補正された請求の範囲1-11項に置き換えられた。”
3. [原請求の範囲の項数が14で、補正が一部の請求の範囲の削除と新たな請求の範囲の追加を含む場合] :  
“請求の範囲1-6及び14項は変更なし。請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。”又は  
“請求の範囲7-13は削除。新たに請求の範囲15、16及び17項を追加。その他の全ての請求の範囲は変更なし。”
4. [各種の補正がある場合] :  
“請求の範囲1-10項は変更なし。請求の範囲11-13、18及び19項は削除。請求の範囲14、15及び16項は補正された請求の範囲14項に置き換えられた。請求の範囲17項は補正された請求の範囲15、16及び17項に分割された。新たに請求の範囲20及び21項が追加された。”

“PCT19条(1)の規定に基づく説明書”(PCT規則46.4)

補正書には、補正並びにその補正が明細書及び図面に与える影響についての説明書を提出することができる(明細書及び図面はPCT19条(1)の規定に基づいては補正できない)。

説明書は、国際出願及び補正された請求の範囲とともに公開される。

説明書は、国際公開の言語で作成しなければならない。

説明書は、簡潔でなければならない、英語の場合又は英語に翻訳した場合に500語を越えてはならない。

説明書は、出願時の請求の範囲と補正された請求の範囲との相違を示す書簡と混同してはならない。説明書を、その書簡に代えることはできない。説明書は別紙で提出しなければならない、見出しを付すものとし、その見出しは“PCT19条(1)の規定に基づく説明書”の語句を用いることが望ましい。

説明書には、国際調査報告又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して、これらを誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

#### 国際予備審査の請求書が提出されている場合

PCT19条の規定に基づく補正書及び添付する説明書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、補正書(及び説明書)を国際事務局に提出すると同時にその写し及び必要な場合、その翻訳文を国際予備審査機関にも提出することが望ましい(PCT規則55.3(a)、62.2の第1文を参照)。詳細は国際予備審査請求書(PCT/IPEA/401)の注意書参照。

#### 国内段階に移行するための国際出願の翻訳に関して

国内段階に移行する際、PCT19条の規定に基づいて補正された請求の範囲の翻訳を出願時の請求の範囲の翻訳の代わりに又は追加して、指定官庁/選択官庁に提出しなければならないこともあるので、出願人は注意されたい。

指定官庁/選択官庁の詳細な要求については、PCT出願人の手引きの第II巻を参照。



PCT

国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第40、41条)  
(PCT 18条、PCT規則43、44)

出願人又は代理人 の書類記号 99P147W0	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 99/04552	国際出願日 (日.月.年) 24.08.99	優先日 (日.月.年) 24.08.98
出願人(氏名又は名称) 扶桑薬品工業株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT 18条)の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

- a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。  
☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。
- b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。  
☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☒ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。  
☒ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。  
☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。  
☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、  
 第        図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。 ☒ なし  
☐ 出願人は図を示さなかった。  
☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。



## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>6</sup>

C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 5/10, C12P 21/02, C07K16/18, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/08, G01N 33/53, A01K 67/027// (C12N 5/10, C12R 1:91), (C12P 21/02, C12R 1:91), (12P 21/02, C12R 1:91)

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>6</sup>

C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 5/10, C12P 21/02, C07K16/18, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/08, G01N 33/53, A01K 67/027

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

SwissProt/PIP/GeneSeq, Genbank/EMBL/DBJ/GeneSeq, WPI(DIALOG), BIOSIS(DIALOG)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の  
カテゴリー\*

引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示

関連する  
請求の範囲の番号PX  
PYWO, 98/55614, A2 (Genetics Inst. Inc) 10. 12月. 1998 (10. 12. 98)  
全文 & AU, 9878072, A1, 2, 5, 6,  
10-12, 22  
3, 4, 7-9,  
13-21, 23-34

A

Eur. J. Immunol., Vol. 22, (1992) Rujneesh Malhotra et al.,  
"Interaction of Clq receptor with lung surfactant protein A",  
see P. 1437-1445,

1-37

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

23. 11. 11

国際調査報告の発送日

14.12.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

斉藤 真由美

4B

8931

電話番号 03-3581-1101 内線 3448



C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 191, No. 2, (1993), Yasuhiko Suzuki et al. "CLONING AND SEQUENCING OF A cDNA CODING FOR BOVINE CONGLUTININ" 、see P. 335-342	1-37
A	JP, 9-238683, A (株式会社エイジーン研究所) 16. 9月. 1997 (16. 09. 97) ファミリーなし	35-37





# 特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）

出願人代理人

角田 嘉宏

殿

あて名

〒650-0031

兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル3階 有古特許事務所

PCT/JP99/04552

PE402

P C T

## 国際予備審査請求書の受理通知書

（法施行規則第54条第1項）

〔PCT規則59.3(e)及び61.1(b)第1文、実施細則601(a)〕

発送日（日．月．年）

25.01.00

出願人又は代理人  
の書類記号

99P147WO

重 要 な 通 知

国際出願番号

PCT/JP99/04552

国際出願日（日．月．年）

24.08.99

優先日（日．月．年）

24.08.98

出願人（氏名又は名称）

扶桑薬品工業株式会社

1. 国際予備審査機関は、国際出願の国際予備審査請求書を次の日に受理したことを通知する。

12日01月00年

2. この受理の日は次に示す日である。

☒ 管轄する国際予備審査機関が国際予備審査請求書を受理した日  
（PCT規則61.1(b)）

☐ 管轄する国際予備審査機関に代わって国際予備審査請求書を受理した日  
（PCT規則59.3(e)）

☐ 国際予備審査請求書の手続き補完書を管轄する国際予備審査機関が受理した日

3. ☐ 受理の日は、優先日から19箇月が経過している。

（注意） 国際予備審査請求書に記載した選択国の国内段階開始時期の優先日から30箇月まで（遅い官庁がある）の効果はない。（PCT第39条（1））したがって、国内段階移行の手続きは、優先日から20箇月以内（遅い官庁がある）に行わなければならない。（PCT第22条）  
詳細については、PCT出願人の手引き・第II巻」を参照すること。

☐ この内容は、口頭又は電話により次の日に行った連絡を確認するためのものである。

4. 上記の3に該当する場合に、この通知書の写しは国際事務局に送付した。

名称及びあて名

日本国特許庁（IPEA/JP）

郵便番号 100-8915 TEL 03-3592-1308

日本国東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

様式PCT/IPEA/402（1998年7月）

権限のある職員

特 許 庁 長 官



## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT


**NOTIFICATION OF TRANSMITTAL  
OF COPIES OF TRANSLATION  
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY  
EXAMINATION REPORT**

(PCT Rule 72.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SUMIDA, Yoshihiro  
Arco Patent Office  
3rd. Fl., Bo-eki Bldg.  
123-1, Higashimachi, Chuo-ku  
Kobe-shi, Hyogo 650-0031  
JAPON



<b>Date of mailing (day/month/year)</b> 23 January 2001 (23.01.01)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
<b>Applicant's or agent's file reference</b> 99P147WO	
<b>International application No.</b> PCT/JP99/04552	<b>International filing date (day/month/year)</b> 24 August 1999 (24.08.99)
<b>Applicant</b> FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD. et al	

**1. Transmittal of the translation to the applicant.**

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

**2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.**

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

EP,AT,AU,CA,CH,CN,CZ,FI,KP,NO,NZ,PL,RO,RU,SK,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AP,EA,AE,AL,AM,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CR,CU,DE,DK,DM,EE,ES,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,PT,SD,SE,SG,SI,SL,TJ, TM,TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW,OA

**3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).**

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

**It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.**

<b>The International Bureau of WIPO</b> 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No. (41-22) 740.14.35	<b>Authorized officer</b>  Eliott Peretti  Telephone No. (41-22) 338.83.38
---	--



13.T  
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 99P147WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP99/04552	International filing date (day/month/year) 24 August 1999 (24.08.99)	Priority date (day/month/year) 24 August 1998 (24.08.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 5/10, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/08, G01N 33/53, A01K 67/027 // (C12N5/10, C12R 1:91)(C12P 21/02, C12R 1:91)(C12P 21/02, C12R 1:91)		
Applicant FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.  <input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:  I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input checked="" type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 12 January 2000 (12.01.00)	Date of completion of this report 13 September 2000 (13.09.2000)
Name and mailing address of the IPEA/JP  Facsimile No.	Authorized officer  Téléphone No.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/04552

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☒ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☒ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.





# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ational application No.

PCT/JP99/04552

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-37	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-37	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-37	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Document 1: Eur. J. Immunol. Vol. 22, 1992, pages 1437-1445

Document 2: Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 191, No. 2, 1993, pages 335-342

Document 3: JP, 9-238683, A (Eijin Kenkyusho K.K.) 16 September 1997 (16.09.97)

The inventions described in Claims 1-37 appear to involve an inventive step with respect to documents 1-3 cited in the international search report. Documents 1-3 do not describe a polynucleotide, probe, vector, or transformant (including non-human transgenic animals) containing the base sequence described in Sequence No. 1 or a base sequence that codes for the protein comprising the amino acid sequence described in Sequence No. 2, that protein, an antibody to that protein, or a screening method for that protein, and persons skilled in the art cannot easily conceive of these matters based on the descriptions in documents 1-3.



## VI. Certain documents cited

## 1. Certain published documents (Rule 70.10)

<u>Application No. Patent No.</u>	<u>Publication date (day/month/year)</u>	<u>Filing date (day/month/year)</u>	<u>Priority date (valid claim) (day/month/year)</u>
PCT/US98/1210	10 December 1998 (10.12.1998)	01 June 1998 (01.06.1998)	04 June 1997 (04.06.1997) 29.05.98

## 2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

<u>Kind of non-written disclosure</u>	<u>Date of non-written disclosure (day/month/year)</u>	<u>Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year)</u>
---------------------------------------	--	--



発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）



出願人代理人

角田 嘉宏

殿

PCT

あて名

〒 650-0031

兵庫県神戸市中央区東町123番地の1  
貿易ビル3階 有古特許事務所

国際予備審査報告の送付の通知書

(法施行規則第57条)  
[PCT規則71.1]発送日  
(日.月.年)

26.09.00

出願人又は代理人  
の書類記号

99P147WO

重要な通知

国際出願番号

PCT/J P 99/04552

国際出願日

(日.月.年) 24.08.99

優先日

(日.月.年) 24.08.98

出願人（氏名又は名称）

扶桑薬品工業株式会社

1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
2. 国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。
3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備審査報告（付属書類を除く）の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

## 4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に（官庁によってはもっと遅く）所定の手続（翻訳文の提出及び国内手数料の支払い）をしなければならない（PCT39条（1））（様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照）。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。

この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第II巻を参照すること。

名称及びあて名

日本国特許庁（IPEA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員

特 許 庁 長 官

4 B

8 9 3 1

電話番号 03-3581-1101 内線 3448



## 注 意

### 1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することができますが、日本特許情報機構でもこれらの引用文献の複写物を販売しています。日本特許情報機構に引用文献の複写物を請求する場合は下記の点に注意してください。

〔申込方法〕

(1) 特許（実用新案・意匠）公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号（又は特許番号、登録番号）

○必要部数

(2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際予備審査報告の写しを添付してください（返却します）。

〔申込み及び照会先〕

〒100 東京都千代田区霞が関3-4-2 商工会館・弁理士会館ビル  
財団法人 日本特許情報機構 サービス課  
TEL 03-3503-3900

注) 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

### 2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し（既に国際事務局から送達されている場合は除く）及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。（条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照）





P C T

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 99P147WO	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 99/04552	国際出願日 (日.月.年) 24.08.99	優先日 (日.月.年) 24.08.98
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>1</sup> C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 5/10, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/08, G01N 33/53, A01K 67/027 // (C12N 5/10, C12R 1:91), (C12P 21/02, C12R 1:91), (C12P 21/02, C12R 1:91)		
出願人 (氏名又は名称) 扶桑薬品工業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。	
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。	
<input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で _____ ページである。	
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。	
I	<input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎
II	<input type="checkbox"/> 優先権
III	<input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
IV	<input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如
V	<input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
VI	<input checked="" type="checkbox"/> ある種の引用文献
VII	<input type="checkbox"/> 国際出願の不備
VIII	<input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 12.01.00	国際予備審査報告を作成した日 13.09.00	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)  齋藤 真由美	4 B 8931
電話番号 03-3581-1101 内線 3448		



## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- |                                     |         |        |                      |
|-------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 明細書        | 第 _____ | ページ、   | 出願時に提出されたもの          |
| <input type="checkbox"/> 明細書        | 第 _____ | ページ、   | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書        | 第 _____ | ページ、   | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
|                                     |         |        |                      |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲      | 第 _____ | 項、     | 出願時に提出されたもの          |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲      | 第 _____ | 項、     | PCT19条の規定に基づき補正されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲      | 第 _____ | 項、     | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 請求の範囲      | 第 _____ | 項、     | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
|                                     |         |        |                      |
| <input type="checkbox"/> 図面         | 第 _____ | ページ/図、 | 出願時に提出されたもの          |
| <input type="checkbox"/> 図面         | 第 _____ | ページ/図、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 図面         | 第 _____ | ページ/図、 | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |
|                                     |         |        |                      |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ | ページ、   | 出願時に提出されたもの          |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ | ページ、   | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| <input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分 | 第 _____ | ページ、   | _____ 付の書簡と共に提出されたもの |

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☒ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査（または調査）機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査（または調査）機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☒ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)



## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)

請求の範囲 1-37 有  
請求の範囲 無

進歩性(IS)

請求の範囲 1-37 有  
請求の範囲 無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲 1-37 有  
請求の範囲 無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: Eur. J. Immunol. (1992), Vol. 22, p. 1437-1445

文献2: Biochemical and Biophysical Research Communications (1993),  
Vol. 191, No. 2, p. 335-342

文献3: JP, 9-238683, A (株式会社エイジーン研究所) 16.9月.1997 (16.09.97)

請求の範囲1～37に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1～3に対して進歩性を有する。文献1～3には配列番号1に記載の塩基配列又は配列番号2のアミノ酸配列からなるタンパクをコードする塩基配列を含むポリヌクレオチド、プローブ、ベクター、形質転換体(トランスジェニック非ヒト動物を含む)、該タンパク質、それに対応する抗体、スクリーニング方法が記載されておらず、しかもその点は文献1～3から当業者といえども容易に想到し得ないものである。



-----

## VI. ある種の引用文献

## 1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
PCT/US98/1210	10. 12. 98	01. 06. 98	04. 06. 97 29. 05. 98

## 2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)
-----------------	------------------------------	--





7.7.H

EO/US  
PCT/JP99/04552

# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C.20231  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing: 02 March 2000 (02.03.00)	
International application No.: PCT/JP99/04552	Applicant's or agent's file reference: 99P147WO
International filing date: 24 August 1999 (24.08.99)	Priority date: 24 August 1998 (24.08.98)
Applicant: WAKAMIYA, Nobutaka	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:  
12 January 2000 (12.01.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was  
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer:  J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/04552

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>6</sup> C12N15/12, C07K14/435, C12N5/10, C12P21/02, C07K16/18, C12P21/02, C07K16/18, C12P21/08, G01N33/53, A01K67/027// (C12N 5/10, C12R 1:91), (C12P21/02, C12R 1:91), (12P21/02, C12R 1:91)

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>6</sup> C12N15/12, C07K14/435, C12N5/10, C12P21/02, C07K16/18, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/08, G01N 33/53, A01K 67/027

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
SwissProt/PIP/GeneSeq, Genbank/EMBL/DDBJ/GeneSeq, WPI (DIALOG), BIOSIS (DAIALOG)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX PY	WO, 98/55614, A2 (Genetics Inst. Inc), 10 December, 1998 (10.12.98), Full text & AU, 9878072, A	1, 2, 5, 6, 10-12, 22 3, 4, 7-9, 13-21, 23-34
A	Eur. J. Immunol., Vol.22, (1992) Rujneesh Malhotra et al., "Interaction of Clq receptor with lung surfactant protein A", see P.1437-1445,	1-37
A	Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 191, No.2, (1993), Yasuhiko Suzuki et al. "CLONING AND SEQUENCING OF A cDNA CODING FOR BOVINE CONGLUTININ*", see P.335-342	1-37
A	JP, 9-238683, A (Eijin Kenkyusho K.K.), 16 September, 1997 (16.09.97), (Family; none)	35-37

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
"E" earlier document but published on or after the international filing date  
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
23 November, 1999 (23.11.1999)

Date of mailing of the international search report  
14 December, 1999 (14.12.1999)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



PCT

世界知的所有権機関  
国際事務局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<b>(51) 国際特許分類6</b> C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 5/10, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/08, G01N 33/53, A01K 67/027 // (C12N 5/10, C12R 1:91) (C12P 21/02, C12R 1:91) (C12P 21/02, C12R 1:91)	<b>A1</b>	<b>(11) 国際公開番号</b> <b>WO00/11161</b>  <b>(43) 国際公開日</b> 2000年3月2日 (02.03.00)
<b>(21) 国際出願番号</b> PCT/JP99/04552  <b>(22) 国際出願日</b> 1999年8月24日 (24.08.99)  <b>(30) 優先権データ</b> 特願平10/237611 1998年8月24日 (24.08.98) <b>JP</b>  <b>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)</b> 扶桑薬品工業株式会社 (FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP] 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目7番10号 Osaka, (JP) <b>(72) 発明者 ; および</b> <b>(75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ)</b> 若宮伸隆 (WAKAMIYA, Nobutaka) [JP/JP] 〒567-0826 大阪府茨木市大池1丁目9-20 Osaka, (JP) <b>(74) 代理人</b> 角田嘉宏, 外 (SUMIDA, Yoshihiro et al.) 〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123番地の1 貿易ビル3階 有古特許事務所 Hyogo, (JP)	<b>(81) 指定国</b> AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), ユー ラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)  添付公開書類 国際調査報告書	
<b>(54) Title: NOVEL COLLECTIN</b>  <b>(54) 発明の名称</b> 新規コレクチン  <b>(57) Abstract</b> Novel collectin-related molecules expected as exerting antibacterial and antiviral activities, etc. particularly in the human body, namely, a novel collectin gene containing the base sequence represented by SEQ ID NO:1 and a novel collectin containing the amino acid sequence represented by SEQ ID NO:2; and a method with the use of the same.		

## (57)要約

特にヒトの体内で抗細菌、ウイルス活性などを発揮することが期待される新規コレクチンの関連分子すなわち、配列番号：1で示される塩基配列を含む新規コレクチン遺伝子、及び配列番号：2で示されるアミノ酸配列を含む新規コレクチン、これらを用いた方法を提供する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AL	アルバニア	EE	エストニア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AU	オーストラリア	FR	フランス	LR	リベリア	SI	スロヴェニア
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LS	レソト	SK	スロヴァキア
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BB	バルバドス	GD	グレナダ	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BE	ベルギー	GE	グルジア	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MA	モロッコ	TD	チャード
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MC	モナコ	TG	トーゴ
BJ	ベナン	GN	ギニア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BR	ブラジル	GW	ギニア・ビサウ	MG	マダガスカル	TZ	タンザニア
BY	ベラルーシ	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TM	トルクメニスタン
CA	カナダ	HR	クロアチア		共和国	TR	トルコ
CF	中央アフリカ	HU	ハンガリー	ML	マリ	TT	トリニダード・トバゴ
CG	コンゴ	ID	インドネシア	MN	モンゴル	UA	ウクライナ
CH	スイス	IE	アイルランド	MR	モーリタニア	UG	ウガンダ
CI	コートジボアール	IL	イスラエル	MW	マラウイ	US	米国
CM	カメルーン	IN	インド	MX	メキシコ	UZ	ウズベキスタン
CN	中国	IS	アイスランド	NE	ニジェール	VN	ヴェトナム
CR	コスタ・リカ	IT	イタリア	NL	オランダ	YU	ユーゴスラビア
CU	キューバ	JP	日本	NO	ノルウェー	ZA	南アフリカ共和国
CY	キプロス	KE	ケニア	NZ	ニュージーランド	ZW	ジンバブエ
CZ	チェッコ	KG	キルギスタン	PL	ポーランド		
DE	ドイツ	KP	北朝鮮	PT	ポルトガル		
DK	デンマーク	KR	韓国	RO	ルーマニア		

## 明 細 書

## 新規コレクチン

## 5      〔技術分野〕

本発明は、生体防御機構の解明に有用であり、また抗ウイルス活性などを含む生理活性を有することが期待され、医薬品用途への応用が可能であると考えられる、新規コレクチンに関する。

## 10     〔背景技術〕

コレクチンは、 $\text{Ca}^{2+}$ 要求性の糖認識構造様領域（CRD）及びコラーゲン様領域を有するタンパク質の総称であり、細菌、ウイルスを始め様々な微生物に対する基礎免疫に関与していると考えられている。

これまでに見出されているコレクチンとして、マンナン結合タンパク質（MBP）、サーファクタントタンパク質A（SP-A）およびサーファクタントタンパク質D（SP-D）、コングルチニンなどを挙げることができる。これらのコレクチンは、図1（a）に示すような、（1） $\text{Ca}^{2+}$ 要求性の糖認識構造様領域（CRD）、及び（2）コラーゲン様領域の特徴的な領域を含む基本構造から構成されていることが知られており

20     〔Malhortraら、ヨーロッパ・ジャーナル・オブ・イムノロジー（Eur. J. Immunol.）、22巻、1437～1445頁、1992年〕、この基本構造3個がコラーゲン様領域においてトリプルヘリックスを構成することによりサブユニットを形成し、さらにこのサブユニットが3量体、4量体、6量体等のオリゴマー構造を形成している。

25     脊椎動物では、細胞を介する免疫応答および特異的抗体反応によるメカニズムが、病原菌、ウイルスなどの侵入に対する最大の生体防御シス

テムと考えられている。最近になって、コングルチニン等のレクチンによる非特異的な免疫応答への関与が示唆され、例えば、母親の移行抗体や特異的防御システムが十分に発達していない小児に対し、種々の微生物の中和作用や排除に重要な役割を果たしているとの報告がなされている。

5     る〔Superら、ランセット (Lancet)、2巻、1236～1239頁、1989年〕。  
さらに、宿主の生体防御におけるこれらレクチンの役割について、例えば、MBPの遺伝子上の変異に起因したMBPの血中濃度の低下によって、宿主が感染を受けやすくなるという研究結果が報告されている〔Sumiyaら、ランセット、337巻、1569～1570頁、1991年〕。

10     本発明者らのグループは、以前に、コングルチニンおよびマンナン結合タンパク質が、H1およびH3タイプのインフルエンザAウイルスの感染や赤血球凝集活性を阻害することを見出した〔Wakamiyaら、グライココンジュゲイト・ジャーナル (Glycoconjugate J.)、8巻、235頁、1991年；Wakamiyaら、バイオケミカル・アンド・バイオフィジカル・リ  
15     サーチ・コミュニケーションズ (Biochem. Biophys. Res. Comm.)、187巻、1270～1278頁、1992年〕。

その後さらに、コングルチニンをコードするcDNAクローンを取得し、コングルチニンと種々のサーファクタントタンパク質D遺伝子との間の強い関連性も見出されている〔Suzukiら、バイオケミカル・アンド  
20     ・バイオフィジカル・リサーチ・コミュニケーションズ、191巻、335～342頁、1993年〕。

このように、コレクチンは、生体防御機構の解明における有用性及び生理活性医薬物質としての有用性などが期待される物質であり、このファミリーに属する新規分子種の発見は、感染症の治療の他種々の医療分野、そして生物学の分野にも寄与するところ大である。  
25



## 〔発明の開示〕

本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものであり、特にヒトの体内で抗細菌、抗ウイルス活性などの生理活性を発揮することが期待される新規コレクチンを得ることを目的とするものである。

5       すなわち、本発明は、

[1] 配列番号：2の第206～547位で示されるアミノ酸配列からなるタンパク質をコードする塩基配列を含むポリヌクレオチド、

[2] 配列番号：2の第229～547位で示されるアミノ酸配列からなるタンパク質をコードする塩基配列を含むポリヌクレオチド、

10       [3] 配列番号：1の第670～1695位で示される塩基配列を含むポリヌクレオチド、

[4] 配列番号：1の第739～1695位で示される塩基配列を含むポリヌクレオチド、

15       [5] 配列番号：4及び配列番号：5で示される塩基配列を有するプライマーを用いて行ったPCR反応の増幅産物であるプローブと、ストリンジントな条件下でハイブリダイズすることができ、且つコレクチンをコードするポリヌクレオチド、

[6] [1]乃至[5]に記載のポリヌクレオチドとストリンジントな条件下でハイブリダイズでき、該ポリヌクレオチドによってコードされるタンパク質が、(1)  $\text{Ca}^{2+}$ 要求性の糖認識構造様領域(CRD)、及び(2) コラーゲン様領域を含む、ヒトコレクチンであるポリヌクレオチド、

20       [7] [3]乃至[6]に記載のポリヌクレオチドによってコードされる新規コレクチン、

[8] 配列番号：2の第206～547位で示されるアミノ酸配列を含む新規コレクチン、

25       [9] 配列番号：2の第229～547位で示されるアミノ酸配列を含む新規コ

レクチン、

- [10] [7]乃至[9]のいずれかに記載の新規コレクチンのアミノ酸配列において、1または複数のアミノ酸が欠失、置換及び／または付加されたアミノ酸配列からなり、且つ、（1） $\text{Ca}^{2+}$ 要求性の糖認識構造様領域（CRD）、及び（2）コラーゲン様領域を含む、新規コレクチンをその要旨とし、コレクチンに特徴的な構造を有し、従来報告されているものとは異なる新規のコレクチン遺伝子及びタンパク質を提供するものである。

10      〔図面の簡単な説明〕

第1図は、従来報告されている主なコレクチンの基本構造及びタンパク質の概観を示す図である。

第2図は、従来報告されている3種のコレクチンのアミノ酸配列のアラインメントの前半部分を示す図である。

- 15      第3図は、第2図と同様のアラインメントの後半部分を示す図である。

第4図（b）は、本発明の新規コレクチンの塩基配列を決定するために使用した各プライマーの名称と、シーケンサーにより読み取られた塩基配列を示す図であり、第4図（a）は、得られた新規コレクチンの

- 20      ORFを示す図である。

第5図は、従来報告されている3種のコレクチンと、本発明の新規コレクチンのアミノ酸配列のアラインメントの前半部分を示す図である。

第6図は、第5図と同様のアラインメントの後半部分を示す図である。

- 25      第7図は、本発明の新規コレクチンのゲノミックサザン分析の結果を示す図である。各レーンで使用された制限酵素は、（1）EcoR I、

(2) Xba I、(3) Hind III、(4) Pst I、(5) Bgl II及び(6) Bam HIである。

第8図は、本発明の新規コレクチンの臓器分布を示す、ヒトの種々の組織、すなわち、1) 脳、(2) 心臓、(3) 腎臓、(4) 脾臓、  
5 (5) 肝臓、(6) 小腸、(7) 筋組織、(8) 精巣、(9) 胎盤、または(10) 大腸におけるmRNAの発現分布の分析結果を示す図である。

第9図は、本発明の新規コレクチンの種間での保存性を示す、種々の脊椎動物、すなわち、(1) ヒト、(2) サル、(3) ラット、(4)   
10 マウス、(5) イヌ、(6) ウシ、(7) ウサギ及び(8) ニワトリにおけるゲノミックサザン分析の結果を示す図である。

第10図は、種々のコレクチンの遺伝的系統樹を示す図である。

第11図は、本発明の新規コレクチンを発現するベクターの構造を示す模式図である。

15 [発明を実施するための最良の形態]

如上の本発明において、前記ポリヌクレオチド[1]～[6]は、好ましくはcDNAである。

上記[2]に示されるポリヌクレオチドは、少なくとも配列番号：2の第229～547位で示されるアミノ酸配列からなるタンパク質をコードする  
20 塩基配列を含むが、第一メチオニン残基の上流に、さらなる塩基配列、例えば、配列番号：2の第226～228位もしくは第211～228位、または配列番号：2の第102～228位、第91～228位、第9～228位、第1～228位などのアミノ酸配列からなるタンパク質をコードする塩基配列を含みうるものである。

25 また、上記[4]に示されるポリヌクレオチドは、塩基配列の5'上流に配列番号：1の第730～738位もしくは第685～738位、または第358～738

位、第325～738位、第79～738位、第55～738位もしくは第1～738位で示される塩基配列をさらに含む。

さらに、上記[3]または[4]に示されるポリヌクレオチドはの3'下流には、配列番号：1の第1696～2024位で示される塩基配列をさらに含む。

5 る。

なお、本発明の上記タンパク質[7]～[10]はヒト由来であることが、ヒトの体内で抗細菌、ウイルス活性などを発揮できることが期待され、生理活性医薬物質としての有用性に鑑みて好ましい。従って、本発明のタンパク質は、ヒト由来の新規コレクチンを企図するものであり、様々

10 なヒト生体組織を検討したところ、有用と考えられる新規コレクチンがヒト胎盤等に発現されていることが示された。

そして、上記[9]に示される新規コレクチンは、少なくとも配列番号：2の第229～547位で示されるアミノ酸配列を含むものであるが、その第一メチオニン残基の上流に、例えば、配列番号：2の第226～228位も

15 しくは第211～228位、または配列番号：2の第102～228位、第91～228位、第9～228位、第1～228位などのアミノ酸配列をさらに含むものである。

上記[5]または[6]におけるストリンジントなハイブリダイゼーション条件としては、例えば、5 x SSC (20 x SSC (3 M NaCl、0.3 Mクエン酸ナトリウム) を4倍希釈することにより5 x SSCを調製)、1%ブロッ

20 キング剤 (ベーリンガー・マンハイム社製)、0.1% N-ラウロイルサルコシン、0.02% SDSの溶液中で、68℃にて1時間プレハイブリダイゼーション；cDNAプローブ (10 ng/ml) を含む5 x SSC、1%ブロッキング剤、0.1% N-ラウロイルサルコシン、0.02% SDSの溶液中で、55℃にて16時間ハイブリダイゼーション：2 x SSC/0.1% SDS溶液で5分間2回

25 洗浄；55℃にて、0.5 x SSC/0.1% SDS溶液で15分間2回洗浄を行う一連

の処理工程を含むハイブリダイゼーションが含まれるが、当該技術分野における知識に基づき、溶液濃度や温度、時間等の条件を適宜に変更することができる。

そして、上記[10]における、1または複数のアミノ酸の欠失、置換及び／または付加とは、新規コレクチンの親水性・疎水性、酸性・塩基性、含有基などに大幅な変化をきたさず、(1)  $\text{Ca}^{2+}$  要求性の糖認識構造様領域 (CRD) 及び (2) コラーゲン様領域の有する各々の特徴を変えることが少ない範囲でのアミノ酸の欠失、置換及び／または付加を称する。これまでに報告されているコレクチンファミリーのタンパク質のアミノ酸配列とその構造に基づき、例えば (1)  $\text{Ca}^{2+}$  要求性の糖認識構造様領域 (CRD) において 1～10 程度、(2) コラーゲン様領域において 1～100 程度、好ましくは 1～15 のアミノ酸の欠失、置換及び／または付加が許容されると考えられる。

本発明はまた、上記のポリヌクレオチドを、新規コレクチンの発現を許容するように含むベクターを提供する。

このポリヌクレオチドが挿入されるベクターは、プラスミド、 $\lambda$ ファージ、コスミド等のようなレプリコンに、上記新規コレクチンにかかるポリヌクレオチドを組み込んで、新規コレクチンが複製・発現されるようにしたものと言う。例えば、コスミドよりもさらに長い DNA 断片をクローニングできるベクターとして、P1ファージ、F因子および酵母の人工染色体 YAC 等がある。また、 $\lambda$ ファージには置換型ベクターおよび挿入型ベクターが含まれ、これらは導入する遺伝子の長さに応じて適宜選択することができる。また、例えば動物細胞発現可能なベクターとして公知のものに、SV40 系ベクター、ウシパピローマウイルスベクター、ヘルペスウイルスベクター、アデノウイルスベクター、ボックスウイルスベクター、レトロウイルスベクター等がある。市販されているものと

しては、pUC19、pTV118N（寶酒造社製）、pUEX2（アマシャム製）、  
pGEX-4T、pKK233-2（ファルマシア社製）、pMAM-neo（クロンテック社  
製）、pGL2（プロメガ社製）、pDNA3.1+（インビトロジェン社製）等が  
挙げられる。かかるベクターの構築方法は、特に限定されるものではな  
5 く常法により制限酵素、リガーゼ等を利用して行うことができる。

上記ベクターが形質転換またはトランスフェクトされる宿主細胞とし  
て細菌、特に大腸菌を使用する場合には、ベクターは普通少なくともプロ  
モーター領域（プロモーター、オペレーター及びシャインダルガー  
ノ配列を含む）、開始コドン、新規コレクチンをコードする塩基配列、  
10 終始コドン、ターミネーター領域等から構成される。酵母または動物細  
胞を宿主として用いる場合、ベクターは、少なくともプロモーター、開  
始コドン、シグナルペプチド、新規コレクチンをコードする塩基配列及  
び終始コドンを含むことが好ましい。また、エンハンサー配列、新規コ  
レクチンの5'-及び3'-非翻訳領域、スプライシング接合部、ポリアデニ  
15 レーション部位及び選択マーカーをベクターに挿入することもできる。

本発明のベクターに組み込まれるプロモーターとしては、従来よりよ  
く知られているSV40(Simian Virus 40)、SR $\alpha$ 、サイトメガロウイルス  
(CMV) プロモーター、アクチンプロモーター、ウイルス性LTR(Long  
Terminal Repeat)、例えばHTLV-1 LTR、HIV-LTR、ラウス肉芽種ウイル  
20 スLTR、単純ヘルペスチロシンキナーゼウイルスプロモーター等の強力  
なプロモーター、弱いプロモーターに関わらず使用できる。

真核細胞において、線維芽細胞、神経細胞、血液細胞および実質細胞  
等の正常細胞から、癌細胞に至る多くの細胞種に発現を期待する場合、  
一般的なプロモーターとしては、サイトメガロウイルス、チミジンキナ  
25 ーゼ (TK)、 $\beta$ -アクチンおよびSV40初期遺伝子プロモーター等が挙げ  
られる。エンハンサーは通常、プロモーター配列とセットになっている

のでそのまま利用することができる。

また、遺伝子を導入し発現させる細胞および組織が特定されている場合には、細胞に特異的なプロモーターを選択することができる。さらに、これらプロモーターをホモあるいはヘテロに組合せることにより、高発現が期待でき、安定に新規コレクチンが得られるという効果が奏される場合がある。

一方、原核細胞において使用されるプロモーターとして、PBAD、PL、trc、T7、SP6、T3、lac等がある。

主として、これらの原核細胞由来の細胞内で新規コレクチンを高発現させることができるプロモーターは宿主に適合する限り、本発明のプロモーターとして適宜選択して用いることができる。また、遺伝子を導入し発現させる細胞および組織が特定されている場合には細胞に特異的なプロモーターを選択することができる。さらに、これらプロモーターをホモあるいはヘテロに組合せることにより、さらに高発現が期待でき、安定に新規コレクチンが得られるという効果が奏される場合がある。

一方、酵母において使用されるプロモーターとしては、GAL1、AOX1、CUP1、PGK等がある。

上記ベクターに組み込み、目的とするベクターのみを回収するための選択マーカーとしては、ジヒドロ葉酸還元酵素（以下DHFRと略す）遺伝子（メトトレキサート耐性遺伝子）、neo遺伝子（G418耐性遺伝子）等が挙げられ、例えば、DHFR遺伝子が欠損しているCHO細胞を用いて、DHFR遺伝子を選択マーカーとして使用する場合、チミジンを含まない培地によっても選択できる。また、メトトレキサートの濃度を上げて培養し、耐性細胞を選択することにより遺伝子を細胞内で発現させ、さらに高発現の細胞株を得ることもできる。

本発明は、この様に構築されたベクターで形質転換またはトランスフ

エクトされた宿主細胞、例えば、動物細胞、昆虫細胞および微生物細胞（大腸菌、枯草菌、酵母等）で、新規コレクチンを発現することができる宿主細胞も企図するものである。

5 本発明の宿主細胞たる動物細胞としては、ヒト由来の細胞が挙げられるが特に限定されるものでない。例えば、CHO細胞、COS細胞、BHK細胞、Vero細胞、ミエローマ細胞、HEK293細胞、HeLa細胞、Jurkat細胞、マウスL細胞、マウスC127細胞、マウスFM3A細胞、マウス繊維芽細胞、骨芽細胞、軟骨細胞等がある。また、微生物細胞としては、例えば大腸菌および枯草菌等の細菌類ならびにサッカロマイセス・セレビシエおよび  
10 麦酒酵母等の酵母類等が含まれる。

また本発明によって、上記ポリヌクレオチドまたはその断片を含む、新規コレクチン関連分子種をスクリーニングするためのプローブが提供される。新規コレクチン関連分子種とは、図1に示したような特徴的な構造を有し、図10に示す既知コレクチンに包含されない新規コレクチ  
15 ンの分子種を言う。本発明のプローブを用いて、種々の生物の組織細胞等から得た遺伝子との間のハイブリッド形成能を調べ、比較的ストリンジентな条件下でハイブリダイズすることができる遺伝子を探索することによって目的とする新規コレクチン関連分子種をコードする遺伝子をスクリーニングし、これを発現することにより新規コレクチン関連分  
20 子種を取得することが可能となる。上記ポリペプチドの断片のうち、糖認識構造様領域を含む配列番号：1の第1291～1698位の配列のうち少なくとも連続10塩基以上、好ましくは連続20塩基以上の塩基配列からなるもの、またはコラーゲン様領域を含む配列番号：1の第796～1236位の配列のうち少なくとも連続10塩基以上、好ましくは連続20塩基  
25 以上の塩基配列からなるものが、特異性の点からプローブを構成するポリヌクレオチドとして有用である。



本発明はまた、本発明によって得られた新規コレクチン及び／または由来分子を認識する抗体を提供する。本明細書で言う由来分子とは、新規コレクチンと同様の特徴を有する断片（例えば、糖鎖認識部位及び／またはコラーゲン領域を含む断片）、新規コレクチンの前駆体及びそれら

5      らをコードする核酸配列及び／またはその相補的な核酸配列とストリジェントな条件下にてハイブリダイズすることができる核酸によってコードされるアミノ酸配列からなるポリペプチド等が含有される。

新規コレクチン及び／または由来分子に対する抗体（例えばポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、ペプチド抗体）または抗血清は、本発明の新規コレクチン及び／または由来分子あるいはそれらを含む融合タンパク質等を抗原として用い、自体公知の抗体または抗血清の製造法に従って製造することができる。すなわち、本発明の新規コレクチン及び／もしくは由来分子またはそれらを含む融合タンパク質を抗原として、投与により抗体産生が可能な部位にそれ自体または希釈剤、担体と

10      共に温血動物に対して投与される。投与に際して抗体産生を高めるために、完全フロイントアジュバントや不完全フロイントアジュバントを投与しても良い。投与は通常1～6週毎に1回ずつ、計2～10回程度行われる。用いられる温血動物としては、例えばサル、ウサギ、イヌ、モルモット、マウス、ラット、ヒツジ、ヤギ、ニワトリ等が挙げられるが、マウス及びラットが好ましくは用いられる。ラットにはWistar及びSD系ラット等が好ましく、マウスにはBALB/c、C57BL/6及びICR系マウス等が好ましく用いられる。

15      20

モノクローナル抗体産生細胞の作製に際しては、抗原で免疫された温血動物、例えばマウスから抗体価の認められる個体を選択し、最終免疫の2～5日後に脾臓またはリンパ節を採取し、それらに含まれる抗体産生細胞を骨髓腫細胞と融合させることにより、モノクローナル抗体産生

25

ハイブリドーマを調製することができる。抗血清中の抗体価の測定は、例えば後記の標識化新規コレクチンまたは新規コレクチンと抗血清とを反応させた後、抗体に結合した標識剤の活性を測定することによりなされる。融合操作は既知の方法、例えばケーラーとミルスタインの方法

- 5     (Nature, 256, 495, 1975) やその変法 (J. Immunol. Method, 39, 285, 1980, Eur. J. Biochem., 118, 437, 1981, Nature, 285, 446, 1980) に従い実施できる。融合促進剤としてはポリエチレングリコール (PEG) やセンダイウィルス等が挙げられるが、好ましくはPEGが用いられる。さらに融合効率を高めるために、適宜レクチン、ポリー
- 10    ーリジンもしくはDMSOを添加することもできる。

- 骨髄腫細胞としては例えばX-63Ag8、NS-1、P3U1、SP2/0、AP-1細胞等が挙げられるが、好ましくはSP2/0細胞が用いられる。用いられる抗体産生細胞（脾臓細胞）数と骨髄腫細胞数との好ましい比率は1:20~20:1であり、PEG（好ましくは
- 15    PEG1000~PEG6000）を10~80%程度の濃度で添加し、20~40℃、好ましくは30~37℃で1~10分間インキュベートすることにより効率よく細胞融合を実施できる。新規コレクチン及び/または由来分子に対する抗体を産生するハイブリドーマのスクリーニングには種々の方法が使用できるが、例えば、新規コレクチン抗原を直
- 20    接または担体と共に吸着させた固相（例えば、マイクロプレート）にハイブリドーマ培養上清を添加し、次に放射性物質や酵素などで標識した抗免疫グロブリン抗体（細胞融合に用いられる細胞がマウスの場合、抗マウス免疫グロブリン抗体が用いられる）またはプロテインAを加え、固相に結合した抗新規コレクチン抗体を検出する方法、抗免疫グロブ
- 25    リン抗体またはプロテインAを吸着させた固相にハイブリドーマ培養上清を添加し、放射性物質や酵素等で標識した新規コレクチンを加え、固相

に結合した抗新規コレクチンモノクローナル抗体を検出する方法等が挙げられる。

新規コレクチン及び／または由来分子に対するモノクローナル抗体の選別及びクローニングは、自体公知またはそれに準じる方法に従って行うことができる。通常HAT（ヒポキサンチン、アミノプテリン及びチミジン）を添加した動物細胞用選択培地で行われる。選別、クローニング及び育種用培地としては、ハイブリドーマが生育できるものならばどのような培地を用いても良い。例えば、1～20%、好ましくは10～20%の牛胎児血清を含むRPMI培地、1～10%の牛胎児血清を含むGIT培地、またはハイブリドーマ培養用無血清培地等を用いることができる。培養温度は、好ましくは約37℃である。培養時間は、通常5日～3週間、好ましくは1週間～2週間である。培養は、通常5%炭酸ガスを含む空気の存在下で行われる。ハイブリドーマ培養上清の抗体価は、上記の抗血清中の抗新規コレクチン抗体価の測定と同様にして測定できる。すなわち、測定方法としてはラジオイムノアッセイ（RIA）法、酵素免疫測定法（ELISA）法、FIA（蛍光イムノアッセイ）法、プラーク測定法、凝集反応法等を用いることができるが、以下に示すようなELISA法が好ましい。

免疫抗原と同様の操作で調製したタンパク質をELISAプレートの各ウェルの表面に固定化する。次に、非特異的吸着を防止する目的で、BSA（ウシ血清アルブミン）、MSA（マウス血清アルブミン）、OVA（オボアルブミン）、ゼラチンもしくはスキムミルク等を各ウェルに固定化する。この各ウェルにハイブリドーマ培養上清液を添加し、一定時間放置し免疫反応を行わせる。PBS（リン酸緩衝性生理食塩水）等を洗浄液として各ウェルを洗浄する。この洗浄液中には界面活性剤を添加することが好ましい。酵素標識二次抗体を添加し一定時間放置す

る。標識酵素としては、 $\beta$ -ガラクトシダーゼ、アルカリフォスファターゼ、ペルオキシダーゼ等を用いることができる。同じ洗浄液で各ウェルを洗浄後、使用した標識酵素の基質溶液を添加し酵素反応を行わせる。添加したハイブリドーマ培養上清液中に目的とする抗体が存在する場合  
5 合は酵素反応が進行し基質溶液の色が変化する。

クローニングは、通常半固体アガー法や限界希釈法等のそれ自体公知の方法で行うことができ、具体的には前記の方法で目的とする抗体を産生するウェルを確認した後、クローニングを行いシングルクローンを得る。クローニング法としては、培養プレート1ウェルあたりに1個のコロニーが形成するようにハイブリドーマ細胞を希釈して培養する限界希  
10 釈法等を用いると良い。限界希釈法によるクローニングには、コロニー形成能を高めるために支持細胞を用いるか、インターロイキン6などの細胞増殖因子を添加しても良い。その他、FACS（蛍光標示式細胞分取器）及びシングルセルマニプレーション法を用いてクローニングする  
15 ことができる。クローン化されたハイブリドーマを、好ましくは無血清培地中で培養し、至適量の抗体をその上清に加える。この様にして得られた単一のハイブリドーマは、フラスコや細胞培養装置を用いて大量培養を行うか、動物の腹腔内で培養する（J. Immunol. Meth., 53, 313, 1982）ことにより、モノクローナル抗体を得ることができる。フラスコ  
20 内で培養を行う場合は、0～20%のFCS（胎児ウシ血清）を含む細胞培養用培地（IMDM、DMEM、RPMI 1640及びMEM等）を用いて行うことができる。動物の腹腔内で培養する場合は、細胞融合に使用した骨髓腫細胞の由来となった動物と同種、同系統の動物または胸腺欠損ヌード  
マウス等を使用することが好ましく、予めプリスタン等の鉱物油を投与  
25 してからハイブリドーマを移植する。1～2週間後腹腔内に骨髓腫細胞が増殖し、モノクローナル抗体を含む腹水を得ることができる。

本発明によるモノクローナル抗体は、新規コレクチン及び／または由来分子に特異的なエピトープを認識するものを選択することによって、他のタンパク質と交差しないものとすることができる。一般的にそのタンパク質を構成するアミノ酸配列の中から、連続する少なくとも3以上のアミノ酸残基、望ましくは7～20アミノ酸のアミノ酸配列によって提示されるエピトープは、そのタンパク質に固有のエピトープを示すと言われている。従って、新規コレクチン及び／または由来分子のいずれかに記載されたアミノ酸から選択され、かつ連続する少なくとも3アミノ酸残基から成るアミノ酸配列を持つペプチドによって構成されるエピトープを認識するモノクローナル抗体は、本発明における新規コレクチン及び／または由来分子特異的なモノクローナル抗体といえる。新規コレクチン及び／または由来分子に記載されたアミノ酸配列の間で保存されたアミノ酸配列を選べば、新規コレクチンファミリーに共通のエピトープを選択することができる。あるいは各配列に特異的なアミノ酸配列を含む領域であれば、それぞれのタンパク質の識別が可能なモノクローナル抗体を選択することができる。

新規コレクチン及び／または由来分子に対するモノクローナル抗体の分離精製は、通常のポリクローナル抗体の分離精製と同様に免疫グロブリンの分離精製法に従って行うことができる。公知の精製法としては、例えば、塩析法、アルコール沈殿法、等電点沈殿法、電気泳動法、硫酸沈殿法、イオン交換体（例えばDEAE（ジエチルアミノエチル）セファロース等）による吸脱着法、超遠心法、ゲル濾過法、抗原結合固相またはプロテインAもしくはプロテインG等の活性吸着剤により抗体のみを採取し、結合を解離させて抗体を得る特異的精製法のような手法を施すことができる。精製過程において凝集物の形成や抗体価の低下を防止する目的で、例えばヒト血清アルブミンを0.05～2%の濃度で添加

する。その他、グリシン、 $\alpha$ -アラニン等のアミノ酸類、特にリジン、アルギニン及びヒスチジン等の塩基性アミノ酸、グルコースやマンニトール等の糖類または塩化ナトリウム等の塩類を添加しても良い。IgM抗体の場合、特に凝集しやすいことが知られているため、 $\beta$ -プロピオニラクトン及び無水酢酸で処理しても良い。

本発明のポリクローナル抗体は、それ自体公知あるいはそれに準じる方法に従って製造することができる。例えば、免疫抗原（タンパク質抗原）自体、あるいはそれとキャリアタンパク質との複合体を作り、上記のモノクローナル抗体の製造法と同様に温血動物に免疫を行い、該免疫動物から本発明のタンパク質またはその断片に対する抗体含有物を採取して、抗体の分離精製を行うことにより製造することができる。温血動物を免疫するために用いられる免疫抗原とキャリアタンパク質との複合体に関し、キャリアタンパク質の種類及びキャリアとハプテン

との混合比は、キャリアに架橋させて免役したハプテンに対して抗体が効率よくできれば、どのようなものをどのような比率で架橋させても良いが、例えばウシ血清アルブミンやウシサイログロブリン、ヘモシアニン等を重量比でハプテン1に対し、約0.1～20、好ましくは約1～5の割合でカップリングさせる方法が用いられる。また、ハプテンとキャリアのカップリングには、種々の縮合剤を用いることができるが、グルタルアルデヒドやカルボジイミド、マレイミド活性エステル、チオール基、ジチオピリジル基を含有する活性エステル試薬などが用いられる。縮合生成物は、温血動物に対して、抗体産生が可能な部位にそれ自体あるいは担体、希釈剤と共に投与される。投与に際して抗体産生能を高めるため、完全フロイントアジュバントや不完全フロイントアジュバントを投与しても良い。投与は、通常2～6週毎に1回ずつ、計約3～10回程度行われる。ポリクローナル抗体は上記の方法で免役され

た温血動物の血液、腹水等、好ましくは血液から採取することができる。抗血清中のポリクローナル抗体価の測定は、上記血清中の抗体価の測定と同様にして測定できる。ポリクローナル抗体の分離精製は、上記のモノクローナル抗体の分離精製と同様の免疫グロブリンの分離精製法に従って行うことができる。

また、新規コレクチン及び／または由来分子とその他のタンパク質またはポリペプチド断片とを含む融合タンパク質を免疫原として用いることによって抗体を調製することができる。係る融合タンパク質を構成する、その他のタンパク質またはポリペプチド断片として、特にGST（グルタチオン-S-トランスフェラーゼ）が好適であるが、他にも、ポリヒスチジン（好ましくは6個のヒスチジン）、カルモジュリン結合ペプチド（CBP）、プロテインA等を用いてもよい。

尚、ポリヒスチジンを用いた場合、遺伝子組換え法にて発現させた融合タンパク質を単離精製するためには、ニッケルキレーティング樹脂への吸着を利用することができ、pH変動の他、EDTAまたはイミダゾール物質を添加することによって当該樹脂から解離することができる。CBPを用いた場合、発現させた融合タンパク質はカルモジュリンアフィニティー樹脂を用いてアフィニティークロマトグラフィーを行い、その後EGTAを加えることにより当該樹脂から解離することができる。

また、プロテインAを用いた場合、発現させた融合タンパク質はIgGセファロース（例えば、IgGセファロース6FF）カラムを使用したアフィニティークロマトグラフィーを行い、その後pH変動によって当該樹脂から解離することができる。

さらに前記融合タンパク質を構成するタンパク質またはポリペプチド断片の別の例として、Xpress、Thioredoxin、c-myc、V5及びHA/c-myc等を挙げることができ、これらをエピトープとして認識することができる

抗体を用いて、目的とする新規コレクチンとの融合タンパク質を発現した後に抗原-抗体アフィニティーカラムにより単離・精製することができる。

5       このような融合タンパク質を免疫原として用いてモノクローナル抗体を取得する場合、抗体のスクリーニングには新規コレクチンを用いてもよいが、免疫原として用いた融合タンパク質でスクリーニングを実施することが選択性の点で好ましい。

10       好ましい免疫原であるGSTと新規コレクチン及び／または由来分子を含む融合タンパク質は、GST遺伝子のコード領域ならびに新規コレクチン及び／または由来分子のコード領域を含む発現ベクターを形質転換またはトランスフェクトした大腸菌または動物細胞を培養し、その培養液及び／または菌体から融合タンパク質を単離することによって好適に製造することができる。さらにこうして得られた融合タンパク質は、  
15       グルタチオンを有する担体、例えば、グルタチオンセファロースビーズへのアフィニティーによって精製されたものであるとよく、当該グルタチオンセファロースビーズからの融合タンパク質の溶出方法は公知の方法によって行うことができる。こうして、目的の免疫原として好ましい精製された融合タンパク質を、得ることができる。

20       このような融合タンパク質を免疫原として用いてモノクローナル抗体を調製する方法において、抗体のスクリーニングには新規コレクチン及び／または由来分子を用いてもよいが、免疫原として用いた融合タンパク質でスクリーニングを実施することが選択性の点で好ましい。

25       新規コレクチン及び／または由来分子に対するモノクローナル抗体及びポリクローナル抗体は、新規コレクチンに関連する疾病の診断や治療に利用することが可能である。なお、抗体を特にヒトに投与することが意図される場合、ヒト化抗体もしくはキメラ抗体等のヒトに対して免疫



原性を有さないあるいは極力抑えた抗体を用いるのが好ましい。マウスモノクローナル抗体をヒトの体内に投与すると、ヒトにとっては異種タンパクであるので種々の副作用が起こる危険性がある。そこで、ヒトモノクローナル抗体が望ましいが、融合効率が悪くまた抗体産生が安定な  
5 ハイブリドーマを得ることは難しかった。しかし、現在技術は進歩しヒトモノクローナル抗体またはキメラ抗体を作製することが可能となっている。

キメラ抗体とはマウス抗体とヒト抗体のキメラ分子をいう。ヒトに任意の抗原を免疫して抗体を製造することは倫理上不可能である。ゆえに  
10 、マウスに免疫し、そのマウスモノクローナル抗体の遺伝子から抗原と結合する抗体可変部（V領域）を切り出し、ヒト骨髓腫由来の抗体定常部（C領域）遺伝子と結合してキメラ遺伝子を作製する。このキメラ遺伝子を宿主細胞で発現させれば、ヒト・マウス・モノクローナル抗体が産生できる。キメラ抗体はヒトに対する抗原性が少ないため、ヒト体内  
15 に投与する治療用や画像診断用モノクローナル抗体等として利用できる。公知のキメラ抗体の関連技術として、特開平05-304989号、特開平04-330295号、W09106649、特開昭63-036786号、特公平06-98021号に記載の発明等がある。

しかし、最近キメラ抗体よりも有用であるといわれるヒト化抗体が開  
20 発された。ヒト化抗体とは抗体分子の抗原結合部位（CDR：Complementary determining region、相補性決定領域）の遺伝子配列のみをヒト抗体遺伝子に移植（CDRグラフティング）し、抗体分子のCDRを除いた全分子をヒト化した抗体である。本抗体はヒト・マウス・キメラ抗体より、マウスの抗体部分が少ないため、抗原性が少なく安全性が高いと言われ  
25 ている。我が国では現在、成人性T細胞白血病に対するヒト化抗体の臨床試験が行われている。ヒト化抗体の製造方法及びその関連技術につい

ては、米国Genentech社(W09222653、W09845332、W09404679、W09837200、W09404679)及び英国Celltech社(W09429451、W09429351、W09413805、W09306231、W09201059、W09116927、W09116928、W09109967、W08901974、W08901783)等の特許出願がある。

- 5        ヒトモノクローナル抗体の作製方法には細胞融合法以外にも、エプスタイン・バール(Epstein-Barr)ウィルス(EBV)で形質転換する方法、さらにはその形質転換した細胞を親細胞と融合させる方法、遺伝子工学を利用しキメラ抗体、ヒト化抗体を作製する方法などがある。キメラ抗体とは異種の動物の免疫グロブリン遺伝子断片をつなげて作製された
- 10    抗体であり、ヒト化抗体とはマウスなどにヒトにとって異種の抗体を改変して、H鎖とL鎖の相補性決定部(CDR)以外の一次構造をヒトの抗体の対応する一次構造に置換した抗体をいう。ヒトモノクローナル抗体作製の親細胞は、ヒト/マウスのヘテロミエローマであるSHM-D 33株(ATCC CRL 1668)またはRF-S1株を用いるとマウスの親細胞と同等の高い融合効率が得られる。これらの親細胞を用いて得られたハイブリドーマはフィーダー細胞なしでクローニングが可能であり、IgGタイプの抗体を比較的安定にしかも大量に産生することができる。親細胞の培養には、15%FCSを加えたERDF培地を用い、その他の操作はマウスの場合と同様である。また、IgGタイプのヒトモノクローナル抗体を作製するには
- 15    抗原で十分に感作されたヒトリンパ球を末梢血から採取して用いるのが好ましい。
- 20

- 25    十分に抗原で感作されたリンパ球の取得が困難な場合にはin vitroで抗原感作を行うこともできる。上記示した方法等を用いることにより、本発明の抗体をヒト化することができ、ヒトに投与する場合には非常に有用である。

さらに本発明によって提供されるのは、新規コレクチン関連分子種ま

たは新規コレクチン及び／もしくは由来分子を取得するための方法であって、上記の抗体を使用してタンパク質のスクリーニングを行い、新規コレクチン関連分子種、または新規コレクチン及び／もしくは由来分子をスクリーニングを得る工程を含むことを特徴とする方法である。この方法では、種々の生物の体液、組織細胞等に含まれる新規コレクチン関連分子種、または新規コレクチン及び／もしくは由来分子を単離・取得すべく、上記の抗体を使用して免疫反応性を有するタンパク質をスクリーニングする。かかるスクリーニングにおいて、cDNAライブラリーの発現スクリーニングが好適に利用される。

10 本発明のさらなる特徴において、新規コレクチン及び／または由来分子の定量方法であって、上記抗体を使用して、被検試料中に含まれる新規コレクチン及び／または由来分子の免疫学的な結合性に基づき、測定を行うことを特徴とする定量方法が提供される。

この方法において新規コレクチン及び／または由来分子の量を測定するために、前記抗体をイムノブロッティング、免疫沈降またはELISA等において使用するとよく、特にELISA法を行うことが至便であり好ましい。そして、例えば不溶性担体に結合させた抗体と標識化抗体とにより新規コレクチン及び／または由来分子を反応させて生成したサンドイッチ錯体を検出するサンドイッチ法、また、標識化新規コレクチン及び／または由来分子と検体中の新規コレクチン及び／または由来分子を抗体と競合的に反応させ、抗体と反応した標識抗原量から検体中の新規コレクチン及び／または由来分子を測定する競合法を利用して検体中の新規コレクチン及び／または由来分子を測定するとよい。

20 サンドイッチ法による新規コレクチン及び／または由来分子の測定においては、まず、試料中の固定化抗体と新規コレクチン及び／または由来分子とを反応させた後、未反応物を洗浄によって完全に除去し、標識

化抗体を添加する 2 ステップ法もしくは固定化抗体、標識化抗体及び新規コレクチン及び／または由来分子を同時に混合する 1 ステップ法などを用いることができる。

測定に使用される不溶性担体は、例えばポリスチレン、ポリエチレン、  
5 ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリアクリル酸エステル、ナイロン、ポリアセタール、フッ素樹脂等の合成樹脂、セルロース、アガロース等の多糖類、ガラス、金属等が挙げられる。不溶性担体の形状としては、例えばトレイ状、球状、繊維状、棒状、盤状、容器状、セル、試験管等の種々の形状を用いることができる。抗体を吸着した担体は、適宜アジ化ナトリウム等の防腐剤の存在下、冷所に保存する。  
10

抗体の固層化には、公知の化学的結合法または物理的吸着法を用いることができる。化学的結合法としては例えばグルタルアルデヒドを用いる方法、N-スクシンイミジル-4-(N-マレイミドメチル)シクロ  
15 ヘキサン-1-カルボキシレート及びN-スクシンイミジル-2-マレイミドアセテートなどを用いるマレイミド法、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸などを用いるカルボジイミド法が挙げられる。その他、マレイミドベンゾイル-N-ヒドロキシスクシンイミドエステル法、N-スクシミジル-3-(2-ピリジルジ  
20 チオ)プロピオン酸法、ビスジアゾ化ベンジジン法、ジパルミチルリジン法が挙げられる。あるいは、先に被検出物質とエピトープの異なる 2 種類の抗体を反応させて形成させた複合体を、抗体に対する第 3 の抗体を上記の方法で固層化させておいて捕捉することも可能である。

標識物質としては、酵素、蛍光物質、発光物質、放射性物質及び金属  
25 キレート等を使用するのが好ましい。酵素としては、例えばペルオキシダーゼ、アルカリホスファターゼ、 $\beta$ -D-ガラクトシダーゼ、リンゴ

- 酸デヒドロゲナーゼ、ブドウ球菌ヌクレアーゼ、デルター 5-ステロイドイソメラーゼ、 $\alpha$ -グリセロールホスフェートデヒドロゲナーゼ、トリオースホスフェートイソメラーゼ、西洋わさびペルオキシダーゼ、アスパラギナーゼ、グルコースオキシダーゼ、リボヌクレアーゼ、ウレアーゼ、カタラーゼ、グルコース-6-ホスフェートデヒドロゲナーゼ、グルコアミラーゼ、アセチルコリンエステラーゼ等が挙げられ、蛍光物質としては、例えばフルオレセインイソチアネート、フィコビリプロテイン、ローダミン、フィコエリトリン、フィコシアニン、アロフィコシアニン、オルトフタルアルデヒド等が挙げられ、発光物質としてはイン
- 10 ルミノール、ルシゲニン、ルミノール、芳香族アクリジニウムエステル、イミダゾール、アクリジニウム塩及びその修飾エステル、ルシフェリン、ルシフェラーゼ、エクオリン等が挙げられ、放射性物質としては $^{125}\text{I}$ 、 $^{127}\text{I}$ 、 $^{131}\text{I}$ 、 $^{14}\text{C}$ 、 $^3\text{H}$ 、 $^{32}\text{P}$ 、 $^{35}\text{S}$ 等が挙げられるが、これらに限らず免疫学的測定法に使用することができるものであれば特に限定されない。さらに、抗体にビオチン、ジニトロフェニル、ピリドキサールまたはフルオレサミンの様な低分子ハプテンを結合させても良い。好ましくは西洋わさびペルオキシダーゼを標識化酵素として用いる。本酵素は多くの基質と反応することができ、過ヨウ素酸法によって容易に抗体に結合させることができる。
- 20 標識化剤が酵素である場合には、その活性を測定するために基質、必要により発色剤を用いる。酵素としてペルオキシダーゼを用いる場合には、基質溶液として $\text{H}_2\text{O}_2$ を用い、発色剤として 2, 2'-アジノージ- [3-エチルベンズチアゾリンスルホン酸] アンモニウム塩 (ABTS)、5-アミノサリチル酸、オルトフェニレンジアミン、4-アミノ
- 25 アンチピリン、3, 3', 5, 5'-テトラメチルベンジジン等を使用することができ、酵素にアルカリフォスファターゼを用いる場合は基質

としてオルトニトロフェニルフォスフェート、パラニトロフェニルリン酸等を使用することができ、酵素に $\beta$ -D-ガラクトシダーゼを用いる場合は基質としてフルオレセイノージー（ $\beta$ -D-ガラクトピラノシド）、4-メチルウンベリフェニル- $\beta$ -D-ガラクトピラノシド等を使用することができる。

架橋剤としては、N, N'-オルトフェニレンジマレイミド、4-(N-マレイミドメチル)シクロヘキサン酸・N-スクシンイミドエステル、6-マレイミドヘキサン酸・N-スクシンイミドエステル、4, 4'-ジチオピリジン、その他公知の架橋剤が利用可能である。これらの架橋剤と酵素及び抗体との反応は、それぞれの架橋剤の性質に応じて既知の方法に従って行えばよい。また、抗体としては、場合によっては、そのフラグメント、例えばFab', Fab、F(ab')<sub>2</sub>を用いる。また、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体にかかわらず同様の処理により酵素標識体を得ることができる。上記架橋剤を用いて得られる酵素標識体をアフィニティークロマトグラフィー等の公知の方法にて精製すれば、更に感度の高い免疫測定系が可能となる。精製した酵素標識化抗体は、安定剤としてチメロサルもしくはグリセリン等を加えて、あるいは凍結乾燥して冷暗所に保存する。

上記定量方法における測定対象試料は、血漿、血清、血液、尿、組織液、脳脊髄液等の体液等、新規コレクチン及び／または由来分子を含む試料あるいはその前駆体を含む試料であれば限定されない。

さらに本発明は、新規コレクチン及び／または由来分子を定量するためのキットであって、上記抗体を含み、この抗体を用いたELISA法によって被検試料中に含まれる新規コレクチン及び／または由来分子の量が測定されることを特徴とするキットを提供する。このキットには抗体のほか、上記のような定量に必要な試薬類が含まれる。

本発明はまた、新規コレクチン及び／または由来分子を生産するための方法であって、上記抗体を用いて新規コレクチン及び／または由来分子を単離する工程を含む方法を提供する。かかる方法において新規コレクチン及び／または由来分子を単離するために、前記抗体を結合させた担体に試料を接触させて抗原－抗体間の特異的な相互作用を許容し、次いで担体を洗浄した後、結合された目的タンパク質を溶出する工程を含む、カラム法、バッチ法等によるアフィニティークロマトグラフィー及び／または免疫沈降が実施されるとよい。

この方法における試料は、例えば、ヒト由来の胎盤、脾臓等より調製して得られたものでも、また、前記した本発明の新規コレクチンをコードするポリヌクレオチドから発現させることによって調製したものでもよいが、安定に試料を供給可能であるので、発現産物が好適に用いられ、かかる発現工程を含む方法が本発明において企図される。

また、本発明でさらに企図されるのは、新規コレクチン及び／または由来分子の組織内における存在を確認するための方法であり、この方法において、如上の抗体を用いて免疫組織学的検査が行われる。免疫組織学的検査とは、例えば、標識抗体を用いた in situ 免疫組織染色などの技術が採用され、新規コレクチン及び／または由来分子を検出するものである。

さらには、本発明により、上記本発明のポリヌクレオチドを含む組換え遺伝子が安定して染色体に導入され、且つ新規コレクチンを発現することができることを特徴とするトランスジェニック非ヒト動物が提供される。さらに提供されるのは、本発明の新規コレクチンの相同体を含む非ヒト動物において、該相同体をコードする遺伝子の発現を修飾するように（例えば、発現を阻止、促進、あるいは所定条件のみで発現するように）遺伝子導入がなされたことを特徴とするトランスジェニック非ヒ

- ト動物である。この非ヒト動物において遺伝子の発現を正常に調節しているいくつかの重要な部位（エンハンサー、プロモーター、イントロン等）の一部に欠失、置換、付加及び／または挿入などの変異を起こさせることにより、本来の遺伝子の発現レベルと比較して上昇または下降するように人工的に修飾することができる。この変異の導入は、公知の方法により行うことができる（例えば、Lesley, S.A. et al., Promega Notes Magazine, 46, 6-10, 1994; Kunkel, T.A. et al., Methods Enzymol., 154, 367-382, 1987; Sayers, J.R. et al., Biotechniques, 13, 592-596, 1992; Ito W., et al., Gene, 102, 67-70, 1991; Cormack, B., Current Protocols in Molecular Biology, 8.5.1-8.5.9, 1987)。ここで遺伝子としては、cDNA、ゲノムDNAあるいは合成DNAを含む。また、遺伝子の発現には転写と翻訳のいずれのステップも含まれる。

- これら本発明によるトランスジェニック非ヒト動物は、新規コレクション及び／または由来分子の機能あるいは発現調節の研究、新規コレクション及び／または由来分子が関与すると予想される疾患のメカニズム解明、医薬品のスクリーニング・安全性試験に用いる疾患モデル動物の開発に有用である。

- トランスジェニック動物とは狭義には遺伝子組換えにより、外来遺伝子が生殖細胞に人為的に導入された動物のことをいい、広義にはアンチセンスRNAを用いて特定の遺伝子の機能を抑えたアンチセンス・トランスジェニック動物や、胚性幹細胞（ES細胞）を用いて特定の遺伝子をノックアウトした動物、点突然変異DNAを導入した動物を含み、個体発生の初期に外来遺伝子が安定して染色体に導入され、その子孫に遺伝形質として伝達され得る動物のことをいう。

本明細書中でいうトランスジェニック動物とはヒト以外のすべての脊



椎動物を含む広義の意味に解する。本発明におけるトランスジェニック動物は、新規コレクチン及び／または由来分子の機能あるいは発現調節の研究、ヒトにおいて発現している細胞に関連する疾患のメカニズムの解明、医薬品のスクリーニング・安全性試験に用いる疾患モデル動物の開発に有用である。

トランスジェニック動物の作製方法は、位相差顕微鏡下で前核期卵子の核に、微小ピペットで遺伝子を直接導入する方法（マイクロインジェクション法、米国特許第4873191号）、胚性幹細胞を使用する方法などがある。その他、レトロウィルスベクターまたはアデノウィルスベクターに遺伝子を挿入し、卵子に感染させる方法、また、精子を介して遺伝子を卵子に導入する精子ベクター法等が開発されている。

精子ベクター法とは、精子に外来遺伝子を付着またはエレクトロポレーション等の方法で精子細胞内に取り込ませた後に、卵子に受精させることにより、外来遺伝子を導入する遺伝子組換え法である（M. Lavitrano et al., Cell, 57, 717, 1989）。あるいはバクテリオファージP1のcre/loxPリコンビナーゼ系やサッカロマイセス・セレビシアエ（*Saccharomyces cerevisiae*）のFLPリコンビナーゼ系等による *in vivo*における部位特異的遺伝子組換えを用いることもできる。また、レトロウィルスを使用して、非ヒト動物へ目的タンパク質のトランスジェーンを導入する方法も報告されている。

マイクロインジェクション法によるトランスジェニック動物作製方法は、例えば、以下に示すようにして行われる。

まず、発現制御に関わるプロモーター、新規コレクチンをコードする塩基配列、ポリAシグナルから基本的に構成されるトランスジェーンが必要である。プロモーター活性により特定分子の発現様式や発現量が左右され、また、導入トランスジェーンのコピー数や染色体上の導入部位によ

り作製されたトランスジェニック動物が系統間で異なるため、各系統間で発現様式・発現量を確認する。非翻訳領域やスプライシングにより発現量が変化することが判明しているため、予めポリAシグナルの前にスプライシングされるイントロン配列を導入してもよい。受精卵に導入する遺伝子はできるだけ純度の高いものを使用することが重要である。使用する動物としては、受精卵採取用マウス（5～6週齢）、交配用雄マウス、偽妊娠雌マウス、輸精管結紮雄マウス等が用いられる。

効率よく受精卵を得るために、ゴナドトロピン等により排卵を誘発してもよい。受精卵を回収し、マイクロインジェクション法にて卵子の雄性前核にインジェクションピペット中の遺伝子を注入する。注入した卵子を輸卵管に戻すための動物（偽妊娠雌マウス等）を用意し、一匹に対して約10～15個を移植する。その後、誕生したマウスにトランスジェンが導入されているか否かを、尾の先端部からゲノムDNAを抽出し、サザン法あるいはPCR法によりトランスジェンを検出するか、あるいは相同組み換えが起こったときのみに活性化するマーカー遺伝子を挿入したポジティブクローニング法により確認することができる。さらに、トランスジェンの発現を確認するため、ノザン法もしくはRT-PCR法によりトランスジェン由来転写産物を検出する。または、タンパク質またはその断片に対する特異的抗体によって、ウェスタンブロッティングを行ってもよい。

さらに本発明によって、上記本発明の新規コレクチンの相同体を含む非ヒト動物において、該相同体の発現を阻止するように該相同体をコードする遺伝子が改変されて得られることを特徴とするノックアウト非ヒト動物を提供する。

本発明のノックアウトマウスは、新規コレクチン及び／または由来分子遺伝子の機能が失われるように処理されたものである。ノックアウト

マウスとは相同組換え技術により任意の遺伝子を破壊し、機能を欠損させたトランスジェニックマウスをいう。ES細胞を用いて相同組換えを行い、一方の対立遺伝子を改変・破壊した胚性幹細胞を選別し、ノックアウトマウスを作製することができる。例えば、受精卵の胚盤胞や桑実胚期に遺伝子を操作した胚性幹細胞を注入して、胚性幹細胞由来の細胞と胚由来の細胞が混ざったキメラマウスを得る。このキメラマウス（キメラとは、2個以上の受精卵に基づいた体細胞で形成される単一個体をいう）と正常マウスを交配すると、一方の対立遺伝子の全てが改変・破壊されたヘテロ接合体マウスを作製することができる。さらに、ヘテロ接合体マウス同士を交配することで、ホモ接合体マウスが作製できる。

相同組換えとは、遺伝子組換え機構で塩基配列が同じ、または非常に類似している2つの遺伝子間で起こる組換えのことをいう。相同組換えを起こした細胞の選別にはPCRを使用することができる。挿入遺伝子の一部と挿入が期待される領域の一部をプライマーとして用いるPCR反応を行い、増幅産物ができた細胞で相同組換えを起こしていることが判明できる。また、胚幹細胞で発現している遺伝子に相同組み換えを起こさせる場合には、導入遺伝子にネオマイシン耐性遺伝子を結合させておき、導入後に細胞をネオマイシン耐性にさせることにより選択することができる等、公知の方法及びそれらの変法を用いて容易に選択することができる（Capecchi、*Science*、244巻、1288～1292頁（1989）等を参照されたい）

以下に、本発明の新規コレクションに関して、実施例に沿って詳細に説明するが、これら実施例の開示によって、本発明が限定的に解釈されるべきでないことは勿論である。

すなわち、ESTデータベースの検索（実施例1）、スクリーニング用プローブの作製（実施例2）、ヒト胎盤由来cDNAライブラリーのス

クリーニング（実施例3）、新規コレクチンの塩基配列の決定（実施例4）、新規コレクチンのゲノミックサザン分析（実施例5）、新規コレクチンのヒトの種々の組織に対するノーザン分析（実施例6）、新規コレクチンの種々の動物種の組織についてのゲノミックサザン分析（実施例7）ならびに新規コレクチンの遺伝学的解析（実施例8）、新規コレクチンに対するモノクローナル抗体の調製（実施例9）、抗マウス抗ヒト新規コレクチン抗体を用いたELISA法（実施例10）、ヒトに対する免疫原性を低下させた抗体の調製（実施例11）、新規コレクチンの発現ベクターpNOW1-hCL-P1の構築（実施例12）、新規コレクチンを発現するクローンの選択（実施例13）、トランスジェニックマウスの作製（実施例14）及びノックアウトマウスの作製（実施例15）について以下に説明する。

#### 実施例1：ESTデータベースの検索

既知のコレクチンすなわち、ヒトMBP、ヒトSP-A及びヒトSP-Dのアミノ酸配列（図2及び3参照、図中、相同と認められるアミノ酸残基部分に囲みを付した）を比較することにより、分子間に保存性の高い領域の検索を行った。この結果、ヒトMBPのアミノ酸配列における第220番目から246番目までの27アミノ酸（図3、白抜文字部分、配列番号：6）に保存性が高いことが明かとなったので、この領域に相当するコンセンサス配列をいくつか作成し、EST（Expressed Sequence Tags）データベースの検索を行った。ESTデータベースは、1996年10月11日に、676750件の配列を含むものを使用した。

その結果、上記27アミノ酸の配列と相同性の高いアミノ酸配列を含むデータがいくつか得られた。得られたデータのアミノ酸配列についてGenBank/ESTデータベースの検索を行い、既知または未知物質のいずれであるかを判定した結果、コンセンサス配列として、

Glu-Lys-Cys-Val-Glu-Met-Tyr-Thr-Asp-Gly-Lys-Trp-Asn-Asp-Arg-Asn-Cys-Leu-Gln-Ser-Arg-Leu-Ala-Ile-Cys-Glu-Phe (配列番号：3) で示されるアミノ酸配列を用いて検索したときに得られたデータの中に、相同性は高いが未知の塩基配列を含む2種のデータ (登録番号：W72977及びR74387) を得ることができた。これらは、それぞれ、胎盤由来及び胎児心臓由来であり、新規コレクチンの塩基配列の一部を示すクローンであった。

そこで、このうち、胎児心臓由来のクローン (I. M. A. G. E. Consortium Clone ID 34472) をATCC (American Type Culture Collection) より購入して、以下の新規コレクチン取得のためのスクリーニング用プローブ作製に利用した。

#### 実施例2：スクリーニング用プローブの作製

上記クローンのインサートDNAの塩基配列を、プライマー (ファルマシア社製、M13 Universal Primer (配列番号：7、5'-フルオレセイン-cgacgttgtaaacgacggccagt-3') 及びM13 Reverse Primer (配列番号：8、5'-フルオレセイン-caggaaacagctatgac-3')) で決定した。

この塩基配列から読取枠をコレクチンのアミノ酸配列に合わせて、そこから読み取ることができるアミノ酸配列に相当する塩基配列を抽出し、この一部分に相当するジゴキシゲニン (DIG) ラベルcDNAプローブ用プライマー (Reverse プライマー、caatctgatgagaaggtgatg (配列番号：4) 及びForward プライマー、acgaggggctggatgggacat (配列番号：5) を、アプライドバイオシステムズ社製392A DNA/RNAシンセサイザーを用いて作製した。DIGラベルは、PCR DIGプローブ合成キット (ベーリンガー・マンハイム社製) を用いて行った。反応組成は以下のとおりである (プラスミドDNA (クローンW72977、50 ng/ $\mu$ l) : 2  $\mu$ l (100 ng)、10 x 緩衝液：5  $\mu$ l、25 mM MgCl<sub>2</sub> : 5  $\mu$ l、dNTP (PCRラベリ

ングミックス) :  $5\mu\text{l}$ 、 $20\mu\text{M}$  Reverseプライマー :  $2.5\mu\text{l}$ 、 $20\mu\text{M}$  Forward プライマー :  $5\mu\text{l}$ 、 $\text{H}_2\text{O}$  :  $28\mu\text{l}$ 、Taq ポリメラーゼ :  $0.5\mu\text{l}$  )。PCR反応は、アトー社製ザイモリアクターを用いて、 $92^\circ\text{C}$  1分、 $55^\circ\text{C}$  1分、 $72^\circ\text{C}$  2分のサイクルを35回行った。

5 実施例 3 : ヒト胎盤由来 cDNAライブラリーのスクリーニング

先ず、以下のようにヒト胎盤由来ファージ cDNAライブラリーのタイトレーションを行った。mLB培地 ( $10\text{ mM MgSO}_4$  及び  $0.2\%$  マルトースを含むLB培地 ( $1\text{ g}$  トリプトン、 $0.5\text{ g}$  イーストエキストラクト、 $0.5\text{ g NaCl}/100\text{ ml}$ ) で  $37^\circ\text{C}$  にて16時間培養した Escherichia coli Y1090r<sup>-</sup> 0.2 ml と、SM 緩衝液 ( $5.8\text{ g NaCl}$ 、 $2\text{ g MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{ M Tris-HCl}$  (pH 7.5)  $25\text{ ml}$ 、 $5\text{ ml } 2\%$  ゼラチン/L) で段階希釈した cDNAライブラリー  $0.1\text{ ml}$  を  $37^\circ\text{C}$  15分インキュベートし、その後  $2.5\text{ ml}$  のLB-TOP アガロース ( $0.75\%$  アガロース/LB培地) に加え均一とし、 $90\text{mm } \phi$  LB培地プレート (岩城硝子社製) ( $1.5\%$  アガー/LB培地) にまいた。15分間室温で固化させ、 $42^\circ\text{C}$  にて5時間インキュベーションした。各プレートのプラークを計数後、ファージのタイターを計算により求めた。その結果、タイターは  $2.1 \times 10^{10}$  pfu/mlであった。このようにタイトレーションを行った cDNAライブラリーにつき、実施例 2 で作製したプローブを用いて以下の通りにスクリーニングを行った。

20 mLB培地で  $37^\circ\text{C}$  にて16時間培養した Escherichia coli Y1090r<sup>-</sup>  $0.6\text{ ml}$  と SM 緩衝液で希釈した cDNAライブラリー  $1 \times 10^5$  pfu を、 $37^\circ\text{C}$  にて15分間インキュベートし、その後  $7.5\text{ ml}$  LB-TOP アガロース ( $0.75\%$  アガロース) に加えて均一とした。これを  $140\text{ mm}^2$  のLB培地角プレート (日水製薬社製) にまいたものを10枚作製し、15分間室温で固化させ、  
25  $42^\circ\text{C}$  にて5時間インキュベーションした。プラーク形成を確認後、次に、ナイロンメンブレンへの転写を行った。転写は、ナイトラン (Nytran

5 ) 13N (シュライヒャーアンドシュウェル社製 (Schleicher and Schuell Co.)) を用いて行った。12.5 cm x 9.0 cmのフィルターを蒸留水に浸けて10分間湿らせた後、ワットマン3MM紙上において余分な水分を除去し、プラークを形成したプレート上にフィルターを置いた。2  
5 分間放置した後、フィルターを剥がし、10分間風乾させた。0.2 M NaOH / 1.5 M NaClにより 2分間ファージDNAを変性させ、0.4 M Tris-HCl (pH7.6) / 2 x SSCで2分間中和し、2 x SSCで2分間洗浄を行った。その後、GS GENE LINKER (バイオラッド社製) で紫外線照射することによりファージDNAをメンブレンに固定した。ハイブリダイゼーション  
10 及びシグナルの検出は以下の様に行った。フィルターを2 x SSCで湿らせ、余分な水分をワットマン3MM紙で除去し、ハイブリダイゼーションバックに移しハイブリダイゼーション溶液 (5 x SSC、1%ブロッキング剤、0.1% N-ラウロイルサルコシン、0.02% SDS) と68℃にて1時間プレハイブリダイゼーションを行った。続いて、バックからハイブリダイ  
15 ゼーション溶液を除き、そこへDIGでラベルしたcDNAプローブを10 ng/mlになるように調製したハイブリダイゼーション溶液を加え、55℃にて16時間ハイブリダイゼーションを行った。ハイブリダイゼーション終了後、フィルターは室温にて2 x SSC/0.1%SDS溶液で5分間、2回洗浄し、55℃にて、0.5 x SSC/0.1%SDS溶液で15分間2回洗浄した。次に  
20 DIG緩衝液 I (100 mM Tris-HCl、150 mM NaCl (pH7.5)) で1分間、SDSを除去し、DIG緩衝液II (1%ブロッキング剤、DIG緩衝液 I) で30分間、フィルターのブロッキングを行った。DIG緩衝液 I で1分間洗浄し、次いでDIG緩衝液IIで抗DIGアルカリフォスファターゼ標識抗体 (ベ  
25 リンガー・マンハイム社製) を5000倍希釈した溶液を加えて、30分間抗体反応を室温で行った後、室温でDIG緩衝液 I で15分間2回洗浄した。DIG緩衝液III (100 mM Tris-HCl、100 mM NaCl (pH 9.5)、50 mM

MgCl<sub>2</sub>) で3分間処理することによりMg<sup>2+</sup>の濃度を高め、NBT/BCIP (和光純薬社製) をDIG緩衝液IIIに加えた溶液で発色させたところ、10個の陽性クローンが得られた。これらのクローンに相当するプラークをプレートから切り出し、SM緩衝液1 mlを入れたチューブに加え、10分間  
5 攪拌した後SM緩衝液で段階希釈し、この希釈液0.1 mlとmLB培地で37℃16時間培養したEscherichia coli Y1090r<sup>-</sup>0.2 mlを混ぜ、37℃にて15分間インキュベートした。その後、混合液を2.5 ml LB-TOPアガロースに加えて均一とし、90mmφ LB培地プレートにまいたものを10枚作製し、15分間室温で固化させ、42℃にて5時間インキュベーションし、いくつかのプラークを得、一次スクリーニングと同様にして二次スクリーニングを行った。

#### 実施例4：新規ヒトコレクチンの塩基配列の決定

二次スクリーニングで得られた陽性クローンのうち適切と考えられるクローンのプラークをプレートから切り出し、蒸留水 200 μlを入れた  
15 チューブに加えて30分間室温で攪拌した後、15,000 rpmで5分間遠心分離し、上清を得た。

得られた上清を鋳型とし、TaKaRa LA PCR Kit Ver.2 (宝酒造社製) を用い、PCRによりインサートDNAを増幅させた。PCRの反応組成は以下のとおりである (上清 : 27 μl、10 x LA PCR 緩衝液 II  
20 (Mg<sup>2+</sup>不含) : 5 μl、25 mM MgCl<sub>2</sub> : 5 μl、dNTPミックス : 8 μl、20 μM λgt11 Reverseプライマー (配列番号 : 9、5'-ttgacaccagaccaa  
ctggtaatg-3') : 2.5 μl、20 μM λgt11 Forwardプライマー (配列番号 : 10、5'-ggtggcgacgactcctggagcccg-3') : 2.5 μl、LA Taq ポリ  
25 メラゼ : 0.5 μl、H<sub>2</sub>O : 全容量50 μlになるように添加)。PCR反応は、アプライドバイオシステムズ社製ジーンAmp PCRシステム9600を用いて、98℃20秒、68℃5分のサイクルを30回行った。PCR産物は、



1%アガロースゲル電気泳動にて確認後、ゲルからの切り出しにより精製した。精製には、ファルマシア社製Sephaglas BandPrep Kitを用いた。

切り出したDNA断片は、インビトロジェン社製TAクローニングキットのpCR2.1ベクターに組み込んだ。組換えたベクターは、インビトロジェン社製TAクローニングキットに含まれるTOP10F'細胞に形質転換した。  
5 形質転換体をLB培地（100  $\mu$ g/ml アンピシリン）で培養し、アルカリSDS法により各クローンにつき3種類のプラスミドDNAを抽出した。

得られたDNAを適当と考えられる制限酵素で切断し、各DNA断片  
10 をpUC18ベクターに組み込み、XL1-Blue cellに形質転換した。形質転換体をLB培地（100  $\mu$ g/ml アンピシリン）で培養し、アルカリSDS法によりプラスミドを抽出した。CL-P1-2-1からは、EcoR I-Hind IIIフラグメント、Hind III-EcoR Iフラグメントを含むプラスミド、CL-P1-3-4からは、EcoR I-BamH Iフラグメント、BamH I-Sma Iフラグメント、Sma I-Hind IIIフラグメント、Kpn I-Sau3A Iフラグメント、Sau3A I-EcoR I  
15 フラグメント、EcoR I-Kpn Iフラグメント、EcoR I-Sma Iフラグメントを含むプラスミド、CL-P1-3-7からは、EcoR I-BamH Iフラグメント、BamH I-Sma Iフラグメント、Sma I-Hind IIIフラグメント、Kpn I-Sau3A Iフラグメント、Sau3A I-EcoR Iフラグメント、EcoR I-Kpn I  
20 フラグメント、Kpn I-EcoR Iフラグメントを含むプラスミドを得た。プライマーはAutoRead Sequencing Kit（ファルマシア社製）添付のM13 Universal Primer（配列番号：7）、M13 Reverse Primer（配列番号：8）及びFITC（ファルマシア社製FluorePrime）にてラベルした以下のプライマーをDNA/RNAシンセサイザーを用いて作成し、ファルマシア社  
25 製オートリード・シーケンシング・キット及びA. L. F. オートシーケンサーで全領域の塩基配列を決定した。

HPP 1 : 5'-フルオレセイン-cgtgaaaatgaatggaagtgg-3' (配列番号 : 1 1) 、

HPP 2 : 5'-フルオレセイン-ttttatccattgctgttcctc-3' (配列番号 : 1 2) 、

5 HPP 3 : 5'-フルオレセイン-ctggcagtcctcccgaggtccag-3' (配列番号 : 1 3) 、

HPP 5 : 5'-フルオレセイン-gctggtccccccgagagcgt-3' (配列番号 : 1 4)

以上実施した塩基配列決定における概略は、図 4 に示す通りである。

10 図 4 (a) に、得られた新規コレクチンのORFが示され、この中のG-X-Yはコラーゲン様領域を表すものである。また、図 4 (b) に、上記各プライマー名、シーケンサーにより読み取られた塩基配列 (矢印により表される) ならびにM13 Universal Primer (Uで表される) 及びM13 Reverse Primer (Rで表される) を示す。

15 さらに Cap site cDNAを用いて、この配列の転写開始点を含む5'末端領域の塩基配列を決定した。

Cap Site cDNA, Human Liver (NIPPON GENE 社製) により、添付の1RC2 Primer (5'-caaggtacgccacagcgtatg-3' (配列番号 : 1 5)) 及びApplied Biosystems 社製 392A DNA/RNA シンセサイザーにより合成した TGP1 Primer (5'-tcttcagtttccctaataccc-3' (配列番号 : 1 6)) を  
20 用いて第1回PCRを行った。反応混液は、総液量 50  $\mu$ lにて、LA PCR Buffer II (Mg<sup>2+</sup> 不含)、2.5 mM MgCl<sub>2</sub>、それぞれ200  $\mu$ MのdATP、dCTP、dGTP及びdTTP (以上 宝酒造社製) を1  $\mu$ l : Cap Site cDNA Human Liver, 0.5  $\mu$ M 1RC2 Primer (以上 NIPPON GENE 社製)、ならび  
25 に0.5  $\mu$ M TGP1 Primerを含むものとした。PCRは、熱変性95℃にて20秒、アニーリング60℃にて20秒、伸長反応72℃にて20秒を35サイクル、

また繰り返し反応前に熱変性95 °Cにて5分、最後に伸長反応72°Cにて10分を含むプログラムで行った。第1回PCR終了後、nested PCRを行った。第1回PCR産物1 $\mu$ lを鋳型とし、プライマーは添付の2RC2 Primer (5'-gtacgccacagcgtatgatgc-3' (配列番号: 17)) 及び合成  
5 TGP2 Primer (5'-cattcttgacaaacttcataag-3' (配列番号: 18))

(TGP1 Primerと同様にして合成したもの)を用い、第1回PCRと同様の反応組成、プログラム(但し、サイクル数は25サイクル)で行った。以上のPCR反応は宝酒造社製 TaKaRa PCR Thermal Cycler 480により行った。得られたPCR産物をアガロースゲル電気泳動により確認後、バンドをゲルより切り出し、-80 °C, 10 min. 凍結し、15000  
10 rpm, 10 min. 遠心分離後、上清をエタノール沈澱することにより精製した。

精製したDNA断片は、Novagen 社製 pT7Blue Vector に組み込み、このベクターをコンピテントセル XL1-Blue 細胞に形質転換した。形質転換体をLB培地(100 $\mu$ g/ml アンピシリン)で培養し、アルカリ  
15 SDS法によりプラスミドを抽出し、Pharmacia 社製 AutoRead Sequencing Kit 及び A. L. F. DNA Sequencer で塩基配列の決定を行った。プライマーは AutoRead Sequencing Kit 添付の M13 Universal Primer (配列番号: 7) 及び M13 Reverse Primer (配列番号: 8) を  
20 用いた。

この結果、実施例3で取得された新規コレクチンのcDNAクローンは、2024塩基を含み、1026塩基のORF(転写解読枠)を有し(配列番号: 1 参照)、配列番号: 2に示される342のアミノ酸をコードしていることが確認できた。

25 次いで、GenBankデータベースでDNA及びアミノ酸についての相同性の検索を行った結果、得られたアミノ酸配列は、従来見出されている

コレクチンのいずれとも異なる新規タンパク質の配列であることが明らかとなった。

また、従来報告されている3種のコレクチンのアミノ酸配列と、本発明の新規コレクチンのアミノ酸配列を比較した。そのアラインメントを図5及び6に示す。図2及び3と同様に、相同性を有するアミノ酸残基部分に囲みを付した。このアラインメントにより、得られた新規タンパク質は既知コレクチンと相同性を有し、コレクチンファミリーに属していることが示される。

#### 実施例5：新規コレクチンのゲノミックサザン分析

10 実施例4において明らかにされたcDNA配列を有する新規コレクチンの遺伝子が、シングルコピー遺伝子であるかまたはマルチコピー遺伝子であるかを明らかにするために、ゲノミックサザン分析を行った。

ヒト血液由来のヒトゲノムDNA（プロメガ社製）の4 $\mu$ g相当量を、制限酵素の（1）EcoR I、（2）Xba I、（3）Hind III、（4）Pst I、  
15 （5）Bgl IIまたは（6）BamH Iで消化し、0.8%アガロースゲルにて、100 mAで3時間電気泳動した。泳動終了後、ナイロンメンブレン（ナイトラン13N）に転写して、分析用のメンブレンを作製した。転写は、  
まず、電気泳動後のゲルを100 mlの0.25 N HClに10分間浸し、蒸留水で3回洗浄した後、100 mlの変性液（1.5 M NaCl、0.5 M NaOH）に15分  
20 間2回浸し、100 mlの中和液（0.5 M Tris-HCl、3 M NaCl（pH 6.8））に30分間浸すことによって脱プリン化、変性及び中和の処理を施し、次いでバキュームブロッティングシステム（東洋紡エンジニアリング社製、VB-30）を用いて転写した。この際、メンブレンは、2 x SSCに5分間、次に20 x SSCに5分間浸漬して前処理したものを用い、パッドは、20  
25 x SSCをしみこませておいたものを用いた。転写終了後、UV照射により固定処理を施した。

サザン分析のためのハイブリダイゼーション用プローブとしては、実施例 4 で得られた新規コレクチンの cDNA 配列の ORF の一部分を、プライマー：

5'-gaagacaagtcttcaactcttg-3' (配列番号：19) 及び

- 5 5'-ctctgagtggtgaggccgatc-3' (配列番号：20) と、前記の PCR DIG プローブ合成キットを用いて DIG ラベルした DNA プローブ：

gaagacaagt cttcacatct tgttttcata aacactagag aggaacagca

atggataaaa aaacagatgg tagggagaga gagccactgg atcggcctca

cagactcaga g (配列番号：21) を用いた。ハイブリダイゼーションの

- 10 前に、プローブは 10 分間煮沸し、5 分間ドライアイス/エタノールで急速凍結処理しておいた。

- まず、転写後のメンブレンを 2 x SSC に 5 分間浸し、ExpressHyb Hybridization Solution (クローンテック社製) 10 ml 中で 65°C にて 30 分間プレハイブリダイゼーションを行った。次いで、前記凍結処理後の
- 15 プローブを ExpressHyb Hybridization Solution で 10 ng/ml となるように希釈し、この溶液 2 ml を用いて、65°C にて 1 時間ハイブリダイゼーションを行った。

- ハイブリダイゼーション後のメンブレンの洗浄は、2 x SSC、0.1% SDS 溶液 20 ml で室温にて 5 分間ずつ 2 回振盪し、続いて 0.2 x SSC、0.1
- 20 % SDS 溶液 20 ml で 65°C にて 15 分間ずつ 2 回振盪しながら行った。SDS を除去するために、DIG 緩衝液 I (100 mM Tris-HCl、150 mM NaCl

- (pH 7.5)) 50 ml で室温にて 1 分間 2 回洗浄し、次に DIG 緩衝液 II' (1.5% ブロッキング剤、DIG 緩衝液 I) 50 ml で室温にて 1 時間ブロッキングを行った。次いで、0.2% Tween20 を含む DIG 緩衝液 I で 5000 倍に希
- 25 釈しておいた抗 DIG アルカリホスファターゼ標識抗体 10 ml で 30 分間処理し、0.2% Tween20 を含む DIG 緩衝液 I を 50 ml 用い室温にて 20 分間、振盪

- しながら洗浄を2回行った。10 mlのDIG緩衝液IIIに室温にて3分間2回浸した後、メンブレンをハイブリバックに移し、DIG緩衝液IIIで100倍に希釈しておいたCSPD（登録商標、ベーリンガー・マンハイム社製、化学発光基質）を全体にゆきわたるように延ばし、インスタントフィルムT612（ポラロイド社製）上で感光させた。

この結果、図7の各レーンに示されるように、各制限酵素で処理したゲノムDNAより、それぞれ1～2個のシグナルしか検出されないので、得られた新規コレクチン遺伝子がシングルコピー遺伝子であることが推測された。

#### 10      実施例6：新規コレクチンのヒトの組織における発現分布解析

本発明の新規コレクチンの mRNAの種々の組織における発現を調べるため、RT-PCRにより解析を行った。

- 種々の組織由来のRNA（（1）脳、（2）心臓、（3）腎臓、（4）脾臓、（5）肝臓、（6）小腸、（7）筋組織、（8）精巣、（9）胎盤、または（10）大腸（OriGene Technologies, Inc. 製））を鋳型とし、RNA LA PCR Kit (AMV) Ver. 1.1（宝酒造社製）を用いてRT-PCRを実施した。まず以下の反応組成で逆転写反応を行った。5mM MgCl<sub>2</sub>、1 x RNA PCR Buffer、1mM dNTP Mixture、1U/μl RNaseインヒビター、0.25 U / μl 逆転写酵素、0.125 μM Oligo dT-Adaptor Primer、RNA 1 μgを含み、全量 20 μl になるように RNase 不含の蒸留水で調節した。同時に逆転写酵素を含まない反応組成も調製して、ネガティブコントロールとした。上記反応液を0.2 ml チューブに入れ、TaKaRa PCR Thermal Cycler PERSONAL（宝酒造社製）で42℃で30分間、99℃で5分間、5℃で5分間の1サイクルでPCRを行った。得られたPCR産物を用いて、続いて以下の反応組成でLA PCRを行った。2.5mM MgCl<sub>2</sub>、1 x LA PCR Buffer II（Mg<sup>2+</sup>不含）、2U TaKaRa LA Taq

- 、得られた新規コレクチンのcDNA配列のネック領域から糖認識構造様領域を増幅できるようなプライマー2種類 (RT-PCR Primer U: 5'-gtgcccctggccctgcagaatg-3' (配列番号: 22)、RT-PCR Primer R: 5'-gcataatcaccctggggaacatttttag-3' (配列番号: 23) を0.2  $\mu$ M加え、
- 5 全量 80  $\mu$ l になるように滅菌蒸留水で調節した。PCRは、94°Cで2分間を1 サイクル、94°Cで30秒間、60°Cで30秒間、72°Cで1分30秒間を50 サイクル行った。反応生成物を1 % アガロースゲル電気泳動により分離し、エチジウムブロマイド溶液 (0.1  $\mu$ g/ml) で染色を行い、トランスイルミネーターで泳動パターンを確認し、発現組織を同定した。
- 10 また各組織での発現量を比較するために、各組織で $\beta$ -アクチン遺伝子の一部分を増幅させるRT-PCRを行い、RNAの補正を行った。方法は上記同様、逆転写反応、PCR反応を行い、上記と同様に1%アガロースゲル電気泳動を用いて判定を行った。逆転写反応の組成は、
- 15 5mM  $MgCl_2$ 、1 x RNA PCR Buffer, 1mM dNTP Mixture, 1U /  $\mu$ l RNaseインヒビター、0.25 U /  $\mu$ l逆転写酵素、2.5  $\mu$ M ランダム9 mer、RNA 10 ngを含み、全量 60  $\mu$ l になるように RNase不含の蒸留水で調節した。PCRは30°Cで10分間、42°Cで15分間、99°Cで5分間、5°Cで5分間の1 サイクルを行った。得られた PCR産物を用いて、続いて以下の反応組成で PCR反応を行った。2.5mM  $MgCl_2$ 、1 x LA PCR Buffer II (
- 20  $Mg^{2+}$ 不含)、2U TaKaRa LA Taq, 0.25  $\mu$ M ヒト $\beta$ -アクチン・センスプライマー 5'-caagagatggccacggctgct-3' (配列番号: 24)、0.25  $\mu$ M ヒト $\beta$ -アクチン・アンチセンスプライマー 5'-tccttctgcacacctgtcgga-3' (配列番号: 25) を加え、全量 40  $\mu$ l になるように滅菌蒸留水で調節した。PCRは 94°Cで15秒間、68°Cで30秒間を30サイクル行っ
- 25 た。

この結果を図8に示すが、本発明の新規コレクチンのmRNAが、胎

盤（レーン 9）、脾臓（レーン 4）、腎臓（レーン 3）で発現していることが明らかとなった。特に胎盤での発現が高いことが明らかである。

実施例 7：新規コレクチンの種々の動物についてのゲノミックサザン分析

5       本発明の新規コレクチンの遺伝子が、他の動物種において保存されているか否かを明らかにするために、ゲノミックサザン分析を実施した。

ハイブリダイゼーション用プローブとしては、前記の新規コレクチンの cDNA 配列の ORF に相当する部分を、PCR DIG プローブ合成キット（ベーリンガー・マンハイム社製）を用いて DIG ラベルした DNA プローブを用い、メンブレンは、（1）ヒト（プロメガ社製）、（2）サル（クロンテック社製）、（3）ラット（プロメガ社製）、（4）マウス（プロメガ社製）、（5）イヌ（クロンテック社製）、（6）ウシ（プロメガ社製）、（7）ウサギ（クロンテック社製）及び（8）ニワトリ（プロメガ社製）のゲノム DNA をそれぞれ 5  $\mu$ g ずつ、制限酵素 EcoR I で処理し、アガロースゲルで電気泳動した後に、ナイトラン 13N

10       メンブレンに転写し、UV 照射により固定処理を施したものをを用いた。

以上のプローブとメンブレンを用いて、下記の工程に従ってハイブリダイゼーションを行った。まず、2 x SSC にメンブレンを 5 分間浸し、10ml の ExpressHyb Hybridization Solution 中で 65°C にて 30 分間プレハイブリダイゼーションを行った。次いで、前記と同様に凍結処理されたプローブを ExpressHyb Hybridization Solution で 10 ng/ml となるように希釈し、この溶液 2 ml を用いて、65°C にて 1 時間ハイブリダイゼーションを行った。

15       

20       

ハイブリダイゼーション後のメンブレンの洗浄は、2 x SSC、0.1% SDS 溶液 20 ml で室温にて 5 分間 2 回振盪し、続いて 0.2 x SSC、0.1% SDS 溶液 20 ml で 68°C にて 15 分間ずつ 2 回振盪しながら行った。SDS を除

25



去するために、DIG緩衝液 I で室温にて 1 分間 2 回洗浄し、次に 50 ml の DIG緩衝液 II' で、室温にて 1 時間ブロッキングを行った。次いで、0.2 % Tween20 を含む DIG緩衝液 I で 5000 倍に希釈しておいた抗 DIG アルカリホスファターゼ標識抗体を 10 ml 用いて 30 分間処理し、0.2 % Tween20 を含む DIG緩衝液 I を 50 ml 用い室温にて 20 分間、振盪しながら洗浄を 2 回行った。10 ml の DIG緩衝液 III に室温にて 3 分間 2 回浸した後、メンブレンをハイブリバックに移し、DIG緩衝液 III で 100 倍に希釈しておいた CSPD を全体にゆきわたるように延ばし、インスタントフィルム T612 上で感光させた。

10      この結果を図 9 に示すが、ニワトリ（レーン 8）を除くすべての動物種において明瞭なシグナルが認められることから、本発明の新規コレクチン遺伝子は、哺乳類において保存されていることが明らかとなった。

#### 実施例 8：新規コレクチンの遺伝学的解析

15      得られた新規コレクチンの DNA 配列に基づき、既知のコレクチンとの遺伝的位置付けを明らかにするために解析を行い、遺伝的系統樹を作成した。

解析の対象としたコレクチンは、図 10 に示す各種コレクチンファミリーのタンパク質（図中、CL-L1 は本発明者らが最近単離したヒト肝臓由来のコレクチンを示す（特願平 10-11281 号明細書参照））であり、  
20      GenBank データベースからそれぞれのアミノ酸配列を検索して得られたデータをもとにレクチンドメインを含む領域を用いて clustalw 法でマルチプル・アラインメントを作成し、それらをもとに N-J 法（neighbor-joining 法）を用い、Phylip Version 3.57c package プログラムを用いて遺伝的系統樹を作成した。

25      その結果を図 10 に示すが、SP-D、ウシ CL-43 及びウシコングルチニンで 1 つのクラスターを形成し、さらに MBP 及び SP-A でそれぞれ別々に

クラスターを形成していたが、本発明の新規コレクチン遺伝子はCL-L1と同様これらのいずれのクラスターにも属していないことが示された。また、本発明の新規コレクチンはCL-L1とも異なる、従来報告されているコレクチンとは遺伝的に別のクラスターを形成するものと推測された。

5

#### 実施例 9：新規コレクチンに対するモノクローナル抗体の調製

新規コレクチン100 $\mu$ gをPBS(−)(カルシウムイオン及びマグネシウムイオン不含のPBS)100 $\mu$ lに溶解したものと完全フロイントアジュバンド100 $\mu$ lを混合し、エマルジョンを作成し、BALB/cマウス(雌性、8週齢)2匹の腹腔内に注射する。3週間後、同様に2回目の免疫を行う。但し、完全フロイントアジュバンドのかわりに不完全フロイントアジュバンドを用いる。さらに2週間後、血清を採取し抗体価を測定する。一番抗体価の高いマウスを選び、一週間後、2回目と同様に最終免疫を行う。最終免疫の5日後、脾臓を採取し、細胞浮遊液を調製する。細胞融合は、骨髓腫細胞NS-1細胞 $2 \times 10^7$ 個と調製した脾細胞 $1 \times 10^8$ 個を混合して行う。混液を1,600rpm、6分間室温で遠心後、上清を除去し、残った細胞をほぐしたところにポリエチレングリコール(PEG)を1ml、1分間をかけて添加し、室温で1分間攪拌する。その後、あらかじめ37℃で保温しておいた基本培地(イスコフ培地、15%FCS、2mM L-グルタミン溶液、0.05mM 2-メルカプトエタノール)1mlを1分間かけて滴下しながら軽く混ぜる。この操作をもう一度繰り返した後、今度は8mlを3分間かけて同様の操作を行う。その後、1,000rpm、5分間、室温で遠心することによりPEGを除去する。ペレットをほぐし、そこへ $5 \times 10^5$ 個/mlの胸腺細胞浮遊液(ハイブリドーマ形成率を高めるフィーダー細胞として使用、HATを含むハイブリドーマ増殖培地に浮遊させたもの)100mlを加えて浮遊液を作製する。この浮遊液を96穴プレー

10

15

20

25

トに0.1mlずつまきこみ、CO<sub>2</sub>インキュベーターにて、37℃、5 %CO<sub>2</sub>で培養を行う。

- ハイブリドーマの選択は以下のようにして行う。培養開始1日後、各ウェルにHAT培地（HATを含むハイブリドーマ増殖培地）150  $\mu$ lを添加した後、引き続き、2日間培養する。2日後培地の150  $\mu$ lを除去し、そこへHAT培地150  $\mu$ lを添加して培地交換を行い、さらに3日および7日培養後も、同様に培地交換を行う。その4日後、培養上清100  $\mu$ lを採取し新規コレクチンに対する抗体価を測定してスクリーニングを行う。次に、抗体陽性細胞をパスツールピペットを用いて、96穴プレートから24穴マルチプレートに移す。この時、各ウェルにあらかじめHT培地（ヒポキサンチン及びチミジンを含むハイブリドーマ増殖用培地）0.5mlを添加しておく。3日間培養後、培地を一部採取し、抗体価を再測定した結果、抗体陽性と判断できる細胞をクローニングおよび凍結保存する。クローニングは陽性細胞を胸腺細胞浮遊液で限界希釈して1個/mlに調製し、96穴マルチプレートに0.2mlずつまきこむ。10日間培養後、1ウェルに1個だけコロニーを形成しているものの抗体価を測定し、高い抗体価が示されたもの2個を選択する。この2コロニーについて再クローニングを行う。方法は1回目のクローニングと同様の方法で行う。抗体陽性細胞は続いて培養拡大を行う。まず、24穴マルチプレートに移した後、3日間培養後、25cm<sup>2</sup>フラスコに移し、さらに3日後、225cm<sup>2</sup>フラスコに移して培養をさらに3日間続け、培養上清を回収することによってモノクローナル抗体を調製する。

- また、腹水からのモノクローナル抗体の製造は、クローニング済みのハイブリドーマを $1 \times 10^7$ 個/mlに調製し、マウス1匹当たり1mlを腹腔内に注射することにより行う。1週間後、腹部の肥大したマウスをエーテルで麻酔し、腹水を採取する。血清分離剤入り凝固促進型遠心管に移

し、室温30分間放置後、3,000rpm、5分間遠心する。上部の腹水を回収、さらに硫酸塩析で精製して抗体を得る。

実施例10：抗マウス抗ヒト新規コレクチン抗体を用いたELISA法

- 5 抗マウス抗ヒト新規コレクチン抗体をコーティングバッファー（50mM 炭酸-炭酸水素バッファー、pH9.6）で10 $\mu$ g/mlに希釈し、この抗体液を96穴ELISAプレートに100 $\mu$ lずつ分注する。その後、4℃で一晩インキュベートする。洗浄液（TBS/T液（25mM Tris-HCl, 0.14M NaCl, 5mM KCl, 0.05% Tween 20, pH7.4））300 $\mu$ lで3回洗浄する。以下の
- 10 洗浄は同様にして行う。5%スキムミルク/TBS/T液300 $\mu$ lを分注し、37℃、1時間静置する。洗浄後、被験試料および新規コレクチン標準品を100 $\mu$ l分注し、37℃にて1時間静置する。このとき被験試料は適当に希釈を行い、標準品は0.02 $\mu$ g/mlを最高濃度とし2倍連続希釈列を用いる。洗浄後、1 $\mu$ g/mlビオチン化抗ウサギ抗ヒト新規コレクチン抗体
- 15 100 $\mu$ lを分注し、37℃、1時間静置する。洗浄後、ビオチンストレプトアビジン液100 $\mu$ lを分注し、37℃、30分間静置する。さらに洗浄後、3, 3', 5, 5'-テトラメチルベンチジン溶液100 $\mu$ lを分注し、30分間室温にて放置後、1N リン酸100 $\mu$ lを添加することにより、反応を停止し、波長450 nmで吸光度を測定を行う。
- 20 この方法を用いて標準品により検量線を作成し、新規コレクチンを定量する。

実施例11：ヒトに対する免疫原性を低下させた抗体の調製

- まず、実施例9に記載の方法で得られたマウスハイブリドーマからmRNAを調製し、ファージベクターを用いたcDNAライブラリーを作
- 25 製、cDNAクローニングを行う。定常領域cDNAをプローブとしたマウス抗体cDNAクローニングし、制限酵素を用いて挿入されたcD

NAの解析を行い、抗体 cDNA の塩基配列の決定する。

次に、キメラ抗体を発現させ、クローニングした抗体遺伝子における変異の有無などを抗体結合活性から確認し、また、発現させたヒト化抗体の結合活性を検討するときのポジティブコントロールとして使用する。

5      。キメラ抗体を発現する際には、ヒト抗体H鎖、L鎖の定常領域遺伝子が一つのベクター上にクローニングされているカセットタイプの発現ベクターを用いる。キメラ抗体の結合活性を確認し、クローニングしたマウス抗体遺伝子に間違いがないと判断できたところで、ヒト化抗体遺伝子の構築を行う。キメラ抗体作製法とは異なり、ヒト化抗体の場合は構築する遺伝子の設計を行わなければならない。決定されたマウスの抗体可変領域遺伝子の塩基配列をもとに、データベースを利用して相同性の高いヒト抗体可変領域のアミノ酸配列を検索する。CDR配列を除いて70

10      ～80%の相同性を有するものを見だし、このように選択したヒト抗体可変領域からCDR配列を除いた領域（フレームワーク領域）にマウス抗体CDR配列を移植して、蛋白構造解析ソフトにより分子モデリングを行う。モデリングにより抗原と結合するH鎖、L鎖上の合計6個のCDRが三次元構造上最もオリジナルのマウスモノクローナル抗体のものに近くなるように、ヒトフレームワーク領域の配列をH鎖、L鎖それぞれ数アミノ酸ずつをマウス型に戻す。この場合、マウス型に戻す数が少なければ

15      少ないほど、よりヒト抗体に近い抗体が得られるので理想的である。このような分子モデリングでは、一つのモデルから出発したヒト化抗体がマウスモノクローナル抗体に等しい活性を100%再現できる確立は低い

20      ため10種類以上のバージョンのヒト化抗体遺伝子を設計、発現して活性を比べる。

25      遺伝子設計終了後、実際に遺伝子の構築を行う。ヒト化抗体H、L鎖の定常領域遺伝子を含むカセットタイプの発現ベクターにクローニング

し、COS細胞などを用いて一過性発現を行い培養上清の抗体活性をE L I S A法を用いて確認する。活性の強かった数種類を選択して、それぞれ恒常発現用の発現ベクターとCOS細胞などの宿主細胞を用いて恒常発現する細胞を確立し、培養上清から精製抗体を調製する。

5      実施例 1 2 : 新規コレクチンの発現ベクターpNOW1-hCL-P1の構築

まず、配列番号 : 1 に示す新規コレクチンの開始コドンから終止コドンまでを、aaggaaaaaa gcggccgcat gcaacaagat ttgatgaggの塩基配列 (配列番号 : 2 6) からなるプライマーと、gctctagatt ataatgcaga tgacagtacの塩基配列 (配列番号 : 2 7) からなるプライマーを用いて、  
10      ギャングリアクター (アトー社製) で増幅させる。

得られた新規コレクチンの c D N A を制限酵素NotIとXbaIで消化して、新規コレクチンの c D N A の670~1698 bpに対応する c D N A 部分 (配列番号 : 1 参照) を得、これを挿入体とする。

次に、発現ベクターpNOW/CMV-A (特開平10-179169号明細書参照) を  
15      、制限酵素NotIとXbaIで消化して、サイトメガロウイルスプロモーター (pCMV) の下流、すなわち、P<sub>cmv</sub> (サイトメガロウイルス初期主要抗原プロモーター) とBGPポリA (ウシ成長ホルモンポリアデニレーションシグナル) の間に、前述の挿入体をD N A ライゲーションキット (宝酒造製) を用いて挿入する。このようにして得られた発現ベクターをプラス  
20      ミドpNOW1-hCL-P1 (hCL-P1 : 新規コレクチンをコードする塩基配列) と命名し、その構造の模式図を第 1 1 図に示す。

実施例 1 3 : 新規コレクチンを発現するクローンの選択

(1) ジヒドロ葉酸還元酵素欠損 (dhfr<sup>-</sup>) のチャイニーズハムスター  
卵巣 (CHO) 細胞への発現ベクターpNOW1-hCL-P1の導入

25      ウシ胎児血清 (FCS、GIBCO社) を10%添加した (ヒポキサンチン、チミジンを含まない) Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM、GIBCO

- 社)を調製し、これにDHFR遺伝子が欠損した(dhfr<sup>-</sup>)DG44 CHO細胞株を、  
1 × 10<sup>5</sup>細胞/mlになるように混合し、これを直径60mmのディッシュに  
播種し、37℃で、5 %炭酸ガス(CO<sub>2</sub>)の条件下で、24時間培養する。培  
養上清を廃棄し、その代わりに別途予め、5 μgのDNA (発現ベクタ  
5 ーpNOW1-hCL-P1) をリポフェクチン溶液 (DOTAP Liposomal Transfect-  
ion Reagent; ベーリンガーマンハイム社製) に混合して得た溶液100 μl  
を含む10%FCS添加IMDMを加えて6 mlとし、さらにヒポキサンチン(終濃  
度10nM) (GIBCO社製) とチミジン(終濃度100nM) (GIBCO社製) を加え、16時  
間培養し、dhfr<sup>-</sup>の宿主CHO細胞への発現ベクターpNOW1-hCL-P1の導入を  
10 行う。その後、培養上清を廃棄し、10%FCS、ヒポキサンチン、チミジ  
ン添加IMDMの6 mlを加え、さらに24時間培養を行う。

#### (2) ネオマイシン(G418)耐性CHO細胞の取得

- 発現ベクターpNOW1-hCL-P1が導入された細胞を24時間培養した後、こ  
れをトリプシン処理してディッシュより回収し、細胞数を計測した後、  
15 1 × 10<sup>5</sup>細胞/mlになるように400 μg/mlの濃度のネオマイシン(G418)を  
含む10%FCS添加IMDMで細胞を懸濁したものを、0.1ml/ウェルの量で96  
ウェルのマイクロプレート10枚に播種(分注)する。37℃で、5 %炭酸  
ガス(CO<sub>2</sub>)の条件下培養し、2週間後の生存細胞をG418耐性細胞(クロ  
ーン)として取得する。
- 20 これらG418耐性クローンを、hCL-P1の産生性について確認する。hCL-  
P1の産生が確認されたクローンの中からいくつかを選択し、各クロー  
ンを、25cm<sup>2</sup>のカルチャーフラスコに播種する。細胞が密集するまで(お  
よそ3 × 10<sup>6</sup>細胞/25cm<sup>2</sup>カルチャーフラスコ) 培養を行う。それぞれの  
カルチャーフラスコの培養上清を廃棄し、前出のものと同一組成の10%  
25 FCS添加IMDMを2 ml加え、4日間培養し、その培養上清を回収する。回  
収した培養上清中のhCL-P1(rhCL-P1: 組換えヒト新規コレクチン)の産

生量を測定する。なお、hCL-P1の産生量は、対照として下記鈴木らの方法を用いて大腸菌で発現させたhCL-P1、コレクチンの糖認識領域(CRD)とネック領域(同様の方法を用いて大腸菌で発現させたもの)に対する抗ウサギポリクローナル抗体およびhCL-P1(定量対象)を用いて、鈴木らの方法(Y. Suzuki, et al., "Characterization of Recombinant Bovine Conglutinin Expressed in a Mammalian Cell", Biochem. Biophys. Res. Commun., 238, pp.856-863 (1997))に準じて定量する。

### (3) メトトレキセート耐性のCHO細胞の取得

上記実施例13(2)で得られるhCL-P1産生クローンをさらに継代培養して安定化させた後、低濃度のメトトレキセート(MTX)を培地に加えて遺伝子増幅を行う。

まず、5 nM MTX、400  $\mu$ g/mlのG418を加えた10%透析済FCS(JRHバイオサイエンス社製)添加IMDMに、選択した各細胞クローンを混合し、0.1ml/ウェルの量を96ウェルのマイクロプレート10枚に播種(分注)する。37°Cで、5%炭酸ガス(CO<sub>2</sub>)の条件下で培養を行い、2週間後の生存細胞を5 nM MTX耐性細胞(クローン)として取得する。

これら5 nM MTX耐性のクローンを、hCL-P1産生性について確認する。hCL-P1の産生が確認されたクローンの中からいくつかのクローンを任意に選択し、それぞれを25cm<sup>2</sup>のカルチャーフラスコに播種し、細胞が密集するまで2週間培養する。培養上清を廃棄し、前出のものと同じ組成の10%FCS添加IMDM(5 nM MTX、400  $\mu$ g/ml G418を加えたもの)を2ml加え、4日間培養し、その培養上清を回収し、hCL-P1の産生レベルを確認する。なお、hCL-P1の産生量の定量は、実施例10に記載のELISA法に準じて行う。

### 25 実施例14：トランスジェニックマウスの作製

コレクチンは基礎免疫に重要な役割を担っていると考えられている。



また、本発明の新規コレクチンは従来のコレクチンとは遺伝的に別のクラスターを形成するものと考えられるので、免疫に関する新たな知見を得、また当該新規コレクチンの作用機序を解明する上で重要なツールを提供するために、この新規コレクチンのトランスジェニック非ヒト動物

5      を作製する。

本発明のヒト由来の新規コレクチンをマウスで発現させることのできるプラスミドを構築する。まず、ニワトリ $\beta$ -アクチンプロモーターとその上流にサイトメガロウィルスエンハンサーを有する哺乳動物発現ベクター (Niwa, H. et al. ; Gene, 108, 193-200, 1991) より 2.3

10      kb断片をSal I/Pst I消化により切り出し、これをクローニングベクターpBluescript (Stratagene社製) のSal I/Pst I部位へ挿入し、pBsCAG-2ベクターを構築する。この2.3 kb断片中には、上記エンハンサー/プロモーターおよびウサギ $\beta$ -グロビン遺伝子の一部 (第2イントロン、第3エクソン、3' 非翻訳領域) が含まれている。hCL-P1

15      のcDNA (配列番号: 1の第670~1698位) を上記第3エクソンのEcoRI部位に挿入し、トランスジェニックマウス発現用プラスミドp $\beta$ A/hCL-P1を構築する。

次に、アルカリ-SDS法により大量のプラスミドp $\beta$ A/hCL-P1を準備し、CsCl平衡密度勾配超遠心法により精製を行う。p $\beta$ A/hCL-P1をSal I

20      /Bam HI消化した遺伝子を単離し、ベクター部分を切り離す。その後、アガロースゲル電気泳動によりベクターDNA断片と分離し、導入DNA断片をゲルから切り出し、GeneClean II Kitを用いてDNA断片を精製する。エタノール沈殿の後、インジェクション用DNA溶解液 (10mM Tris-HCl (pH7.5), 0.25mM EDTA) に溶解し、15,000rpm (20,000 xg)

25      、5分間の遠心後、上清を回収する。分光光度計で吸光度を測定してDNA濃度を計算し、500 DNA分子/plになるように調製し、マウス第

一細胞期胚へのDNA導入まで、50mlずつ分注して-20℃に保存する。

- 次にDNAを注入するためのマウス受精卵を調製する。まず、受精卵採取用雌性マウスを過排卵誘起を施すため、妊馬血清性性腺刺激ホルモンおよびヒト絨毛性性腺刺激ホルモンを48時間間隔で5 IU/bodyを腹腔内に投与し、雄性マウスと同居させる。膣栓が形成されているマウスの腹腔を開き、卵管を取り出しBWW-Hepes培地 (NaCl 102.2mM、KCl 4.78mM、KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 1.19mM、CaCl<sub>2</sub> 1.17mM、MgSO<sub>4</sub> 1.19mM、NaHCO<sub>3</sub> 4.76mM、Hepes 15mM、乳酸ナトリウム 25mM、ピルビン酸ナトリウム 0.25mM、グルコース 5.56mM、BSA 4mg/mL、EDTA 0.1mM及びフェノールレッド 0.0025%含有) で洗浄した後、300mg/mlのヒアルロニダーゼを含むBWW-Hepes培地に入れる。実体顕微鏡下に卵管膨大部を時計用ピンセットで引き裂き、受精卵を培地中に取り出した後、受精卵をガラスピペットで拾い上げ、BWW-Hepes培地で5回洗浄する。その後、受精卵をミネラルオイルで覆われたBWW培地のドロップの中に入れ、37℃、5% CO<sub>2</sub>インキュベーターで培養する。

- 引き続き、受精卵前核へのDNA注入を行う。60 mmのシャーレにBWW-Hepes培地とDNA溶液 (500 DNA分子/p1) のドロップを作り、その上をミネラルオイルで覆った後、インジェクションピペットとホールディングピペットをそれぞれのインジェクターに取りつけ、BWW-Hepes培地の上のドロップに受精卵を入れる。インジェクションピペットにDNA溶液を吸引し、ごくわずかに陽圧になるようにインジェクターを調節し、先端から持続的にDNA溶液を流出させておく。インジェクションピペット側に雄性前核がくるようにホールディングピペットで卵を吸引し、対物レンズの倍率を40倍にして前核に焦点を合わせた後、インジェクションピペットの先端が前核と同じ平面にくるように調節する。

その後、インジェクションピペットの先端を前核の中に突き刺し、D

NA溶液を注入する。核の膨化を確認した後、ピペットをすばやく抜き取り、インジェクションした卵は下のドロップに移動させ、未処理の卵と混ざらないように操作する。一度に約30個の卵をインジェクションし、その後BWW培地のドロップに移して、37℃、5% CO<sub>2</sub>インキュベーターで培養する。

培養後、受精卵の卵管への移植を行う。ネンブタール注射液を希釈液で10倍に希釈し（終濃度5mg/ml）、体重1gあたり0.01ml腹腔内に投与して偽妊娠マウスに麻酔をかける。約30個の卵をできるだけ少量の培地（0.5～1.0ml）とともに吸い上げておいたトランスファーピペットを用いて、卵管開口部に注入する。卵巣と卵管を体内に戻して切り口を縫合する。その後飼育を続けて、およそ19日後に出産する仔を得る。

トランスジェニックマウスのスクリーニングはドットプロットハイブリダイゼーションにより以下のようにして行う。得られた仔は生後4週間で離乳させ、尾部の先端部分約1cmを麻酔下で切断し、1.5mlのエッペンドルフチューブに入れる。0.5mg/mlのプロティナーゼKを含むSTE buffer（50mM Tris-HCl, 100mM EDTA（pH7.5）, 0.5%（w/v）SDS）を0.5ml加え、55℃のインキュベーター中で一晩振盪する。尾部溶解液のうち100mlを新しいチューブに取り、TE飽和フェノール200mlとTE buffer 110mlを加え、ボルテックスミキサーに5分間かけた後、15,000rpm

（20,000 xg）、5分間、室温で遠心する。得られた水層200mlを新しいチューブに取り、フェノール／クロロホルムを200ml加えて5分間ボルテックスミキサーにかけた後、15,000rpm（20,000 xg）、5分間、室温で遠心する。上清を新しいチューブに取り、3M 酢酸ナトリウム20mlとエタノール500mlを加え、DNAの糸状沈殿物が目視可能となるまで十分混合するように振り、15,000rpm（20,000 xg）、5分間、4℃で遠心する。上清を除いて70%エタノールで洗浄の後、5分間乾燥させ、DNA沈

殿を100mlの2M NaCl、0.1M NaOH溶液に溶解する。沸騰水浴中で5分間加温後、氷水中で急冷し、DNAを変性させる。96穴マニホールドをセットし、DNAをナイロンメンブレン上にスポットし、メンブレンを風乾した後、80℃、2時間加熱する。導入したDNAのうちマウス由来の配  
5 列を含まない部分をプローブに用いて、通常の方法でハイブリダイゼーションを行う。この結果、シグナルが確認できたものの個体をトランスジェニックマウスとして同定する。

このようにして受精卵に遺伝子注入操作を行うと、受精卵のうち約9割が生存し続ける。この生存卵全てを1匹当たり25個程度となるよう  
10 レシピエントに移植してレシピエントが妊娠するようにし、妊娠およそ19日目生まれる仔を得る。これらの仔の遺伝子解析を行って導入遺伝子の存在を確認する。さらに、これらのトランスジェニックマウスよりF1マウスを得、トランスジーンの伝達性を調べる。

#### 実施例 15：ノックアウトマウスの作製

15 まず、C57BL/6J系マウス由来のES細胞において本発明の新規コレクチンマウス相同体をコードする目的遺伝子の一部のエクソン部分に、選択マーカー遺伝子であるネオマイシン耐性遺伝子を組み込んで、ターゲット  
20 ング用DNAの構築を行う。次にこのDNAのES細胞へのエレクトロポレーションを以下のように実施する。対数増殖期のES細胞(90mmシャーレ1枚)を新鮮なES培地(20% FCS、1mMピルビン酸溶液、0.1mM非必須アミノ酸溶液及び1mM 2-メルカプトエタノールを含む80%  
25 DMEM 培地)に交換して4時間さらに培養し、培地を除去後、PBS(－)でよく洗浄した後、0.1%トリプシン溶液0.5mlで3分間処理する。培地を1ml加えて単一細胞に分散させ、600rpm、4℃、5分間遠心し、上澄みを捨て、PBS(－) 5mlに懸濁し、細胞数を測定する。再度、600rpm、4℃、5分間遠心し、上澄みを捨て、 $1.1 \times 10^7$ 細胞/mlになるようにPBS

- (一)に懸濁する。 $1.1 \times 10^7$ 細胞/mlの懸濁液うち0.9mlをキュベットへ移し、 $1 \mu\text{g}/\mu\text{l}$ のDNA溶液(ターゲッティング用)  $25 \mu\text{l}$  ( $25 \mu\text{g}$ )をキュベットに加えて、室温で、5分間静置する。ジーンパルサーを用いて、 $500 \mu\text{F}$ 、 $230\text{V}$ の条件で、エレクトロポレーションを行い、5分間
- 5 放置後、ES培地(—G418)に懸濁し、フィーダー細胞が敷かれているシャーレ(90mm)4枚に1/4ずつ播く。エレクトロポレーション後、24時間培養したら、 $150 \mu\text{g}/\text{ml}$  G418(活性型)含有ES培地に交換し、その後毎日、培地交換を行う。7日後に以下のとおりにクローニングを行う。
- 10 コロニーの出現した90mmシャーレより培地を除去し、PBS(一)を10ml分注する。実体顕微鏡の下で形態が良好なコロニーをチップで1つずつ掻取し、吸い上げ、それぞれのコロニーは、あらかじめ0.1%トリプシン溶液 $70 \mu\text{l}$ が入れられた96穴プレートへ移す。そのまま $37^\circ\text{C}$ に4~5分間放置し、トリプシン処理を行い、8連ピペットマンを用いて十分にピペ
- 15 ッティング後、あらかじめ $75 \mu\text{g}/\text{ml}$  G418含有ES培地を0.8 ml入れた24穴プレート(フィーダー細胞付き)の4穴へ播く。24時間培養後、 $75 \mu\text{g}/\text{ml}$  G418含有ES培地と交換する。3日後、対数増殖期になったクローンに、0.1%トリプシン $100 \mu\text{l}$ を加え、ES培地を $100 \mu\text{l}$ 加えてピペッティング後、丸底96穴プレートへ移す。48クロンのすべてを処理し
- 20 たら、培養用に $20 \mu\text{l}$ とり、残り $180 \mu\text{l}$ はPCR用に用いる。
- PCR用のクローンを96穴プレートごと $1200\text{rpm}$ 、 $4^\circ\text{C}$ 、5分間遠心した後、培地を除去し、PBS(一)で3回洗浄する。8連ピペットマンを用いて溶解用溶液( $100\text{mM}$  Tris-HCl (pH8.0),  $10\text{mM}$  EDTA, 0.2% (w/v) SDS,  $100\text{mM}$  NaCl,  $100 \mu\text{g}/\text{mL}$  プロテイナーゼK)  $100 \mu\text{l}$ を加え、 $55^\circ\text{C}$ 、1時間
- 25 プロテイナーゼK処理を行う。テープでプレートの回りに封をして、さらに $95^\circ\text{C}$ 、15分間保温してプロテイナーゼKを完全に失活させる。 $4^\circ\text{C}$

にて5分間冷却し、2～3 $\mu$ lをPCR用サンプルとして採取し、第1回目のスクリーニングに用いる（残りは-20℃で保存する）。サンプルは4クローンを1グループとしてセンスプライマー：atgcaacaagatttgatgagg（配列番号：28）及びアンチセンスプライマー：cctacccggtagaattga  
5 cc（配列番号：29）を用いたPCRを行い、電気泳動法によって目的遺伝子を確認することにより陽性グループの同定を行う。-20℃で保存しておいた残りのサンプルのうち、陽性グループに属する各クローンについて、同様にPCRを行い、陽性クローンを同定する。次に培養用クローンのスクリーニングを行う。培養用のクローン20 $\mu$ lを、24穴プレ  
10 ート（フィーダー細胞付き）の4穴／列へ播き、全部が埋まったらCO<sub>2</sub>インキュベーターへ入れて培養し、最終的に1クローンを3穴に分けて6穴プレート（フィーダー細胞付き）に植え継ぐ。

遺伝子を導入したES細胞塊を下記のとおり調製したマウスの2.5日胚（8細胞期胚）2個で挟み込むサンドイッチ法により生殖系列キメラマウスの作成を行う。  
15

2.5日胚の調製は、以下の様に行う。2.5日胚ES細胞の接着の6日前に5 IUのPMSG（妊馬血清性腺刺激ホルモン）を採卵用のC57BL/6J系雌性マウスの腹腔内に投与する。4日前さらに5 IUのhCG（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン）を腹腔内に投与し、雄と交配させる。3日前、膣栓により  
20 交尾を確認し、自然発情している偽妊娠用雌マウスを精管結紮雄マウスと交配させる。膣栓により交尾を確認し、偽妊娠マウスとする。接着当日採卵用雌マウスを頸椎脱臼により安楽死させ、卵管および子宮を摘出する。卵管と子宮をBWW-Hepes培地で環流し、2.5日胚（8細胞期胚および桑実胚）を採取し、胚をBWW培地のドロップに移し、CO<sub>2</sub>インキュベ  
25 ーター（5%CO<sub>2</sub>, 37℃）中で培養する。採卵し2.5日胚を酸性タイロイド液のドロップ（200 $\mu$ l）に移し、1～2分間静置し、透明帯が溶解したら

すぐにBWW-Hepes培地で6回洗浄してES細胞との接着に使用する。

ES細胞の調製は以下のようにして行う。接着当日、フィーダー細胞上に培養しているES細胞をPBS (-)で2回洗浄し、0.05%トリプシン液を2分間作用させ、数十細胞の塊となるようにシャーレから剥取する

- 5     。ES培地 (-G418) を加え、トリプシンを不活化し、遠心後、ES培地に懸濁する。0.1%ゼラチンを被覆したシャーレに播き、15分間 CO<sub>2</sub> インキュベーター中に静置する。シャーレに接着しなかった細胞を集め、これを集合キメラ作製に使用する。

- 10     2.5日胚とES細胞の接着は、以下のようにして行う。まず、細菌培養用のシャーレの底にニードルで小さな穴を開ける。穴を20  $\mu$  lのBWW培地のドロップで覆い、さらにミネラルオイルでカバーする。CO<sub>2</sub> インキュベーターに入れ、培地をこの条件に平衡化しておき、実体顕微鏡下に良好な形状を有する、10~20個からなるES細胞塊を選別する。先に作製した穴の中に、ES細胞塊を1つずつ入れる。透明帯を除去しておい
- 15     た2.5日胚を2個ずつ穴の中に入れ、ES細胞塊と接着させる。CO<sub>2</sub> インキュベーターで一晩培養し、2個分の大きさからなる1つの胚盤胞を得る。

- 次に、3.5日胚を子宮へ移植する。偽妊娠マウス (交尾後2.5日) の腹腔内にネンブタール注射液を投与し (体重1g当たり50  $\mu$  g)、麻酔をかける。
- 20     麻酔のかかったマウスの後背部を開き、脂肪塊を摘んで子宮を引き出す。一晩培養してできた胚盤胞もしくは桑実胚を、10~15個ずつ少量の培地 (0.5~1.0  $\mu$  l) とともにピペットで吸いあげ、実体顕微鏡下で、注射針で子宮壁の卵管に近い部分に穴を開け、その穴にピペットを挿入して、胚を子宮内に移植する。子宮を体内に戻して切り口を縫合し
- 25     、およそ18日後に出産する仔を得る。

生殖系列への伝達を確認後、ヘテロ同士のマウスをかけ合わせるこ

によりホモ化し、目的とする本発明の新規コレクチンの相同体を発現しないノックアウトマウスを得る。

〔産業上の利用可能性〕

- 5       以上説明したように本発明によって、抗菌性、抗ウイルス活性が確認されているコレクチンに特徴的な構造を有し、従来報告されているものとは異なる新規コレクチン及びそれをコードする遺伝子が提供される。

- 10       本発明によって得られる配列情報は、生体防御機構の解明に有用であり、また新規コレクチンが有する生物学的活性を利用した医薬、実験用途のツールを提供することができる。例えば、この新規コレクチンを発現できるベクター、このベクターを発現可能に含む宿主細胞、新規コレクチンに対する抗体の他、新規コレクチン関連分子種をスクリーニングするためのプローブが提供される。

- 15       さらに、新規コレクチン及び／または由来分子の機能あるいは発現調節の研究、ヒトにおいて発現している細胞に関連する疾患のメカニズムの解明、医薬品のスクリーニング・安全性試験に用いる疾患モデル動物として有用なトランスジェニック非ヒト動物、ノックアウト非ヒト動物が本発明によって提供される。



## 請求の範囲

1. 以下のアミノ酸配列すなわち、

- 5 Met-Gln-Gln-Asp-Leu-Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-Val-Ala-Asn-  
Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu-Met-Lys-Leu-Val-Asp-Ser-Lys-His-Gly-  
Gln-Leu-Ile-Lys-Asn-Phe-Thr-Ile-Leu-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Arg-  
Gly-Pro-Arg-Gly-Asp-Arg-Gly-Ser-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Thr-Gly-  
Asn-Lys-Gly-Gln-Lys-Gly-Glu-Lys-Gly-Glu-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-  
10 Ala-Gly-Glu-Arg-Gly-Pro-Ile-Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Pro-Gly-Glu-Arg-  
Gly-Gly-Lys-Gly-Ser-Lys-Gly-Ser-Gln-Gly-Pro-Lys-Gly-Ser-Arg-Gly-  
Ser-Pro-Gly-Lys-Pro-Gly-Pro-Gln-Gly-Pro-Ser-Gly-Asp-Pro-Gly-Pro-  
Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Lys-Glu-Gly-Leu-Pro-Gly-Pro-Gln-Gly-Pro-Pro-  
Gly-Phe-Gln-Gly-Leu-Gln-Gly-Thr-Val-Gly-Glu-Pro-Gly-Val-Pro-Gly-  
15 Pro-Arg-Gly-Leu-Pro-Gly-Leu-Pro-Gly-Val-Pro-Gly-Met-Pro-Gly-Pro-  
Lys-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Ser-Gly-Ala-Val-Val-Pro-Leu-  
Ala-Leu-Gln-Asn-Glu-Pro-Thr-Pro-Ala-Pro-Glu-Asp-Asn-Gly-Cys-Pro-  
Pro-His-Trp-Lys-Asn-Phe-Thr-Asp-Lys-Cys-Tyr-Tyr-Phe-Ser-Val-Glu-  
Lys-Glu-Ile-Phe-Glu-Asp-Ala-Lys-Leu-Phe-Cys-Glu-Asp-Lys-Ser-Ser-  
20 His-Leu-Val-Phe-Ile-Asn-Thr-Arg-Glu-Glu-Gln-Gln-Trp-Ile-Lys-Lys-  
Gln-Met-Val-Gly-Arg-Glu-Ser-His-Trp-Ile-Gly-Leu-Thr-Asp-Ser-Glu-  
Arg-Glu-Asn-Glu-Trp-Lys-Trp-Leu-Asp-Gly-Thr-Ser-Pro-Asp-Tyr-Lys-  
Asn-Trp-Lys-Ala-Gly-Gln-Pro-Asp-Asn-Trp-Gly-His-Gly-His-Gly-Pro-  
Gly-Glu-Asp-Cys-Ala-Gly-Leu-Ile-Tyr-Ala-Gly-Gln-Trp-Asn-Asp-Phe-  
25 Gln-Cys-Glu-Asp-Val-Asn-Asn-Phe-Ile-Cys-Glu-Lys-Asp-Arg-Glu-Thr-  
Val-Leu-Ser-Ser-Ala-Leu (配列番号：2、第206～547位)

からなるタンパク質をコードする塩基配列を含む単離されたポリヌクレオチド

。

2. 以下のアミノ酸配列すなわち、

Met-Lys-Leu-Val-Asp-Ser-Lys-His-Gly-Gln-Leu-Ile-Lys-Asn-Phe-Thr-  
Ile-Leu-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Arg-Gly-Pro-Arg-Gly-Asp-Arg-Gly-  
5 Ser-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Thr-Gly-Asn-Lys-Gly-Gln-Lys-Gly-Glu-  
Lys-Gly-Glu-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Ala-Gly-Glu-Arg-Gly-Pro-Ile-  
Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Pro-Gly-Glu-Arg-Gly-Gly-Lys-Gly-Ser-Lys-Gly-  
Ser-Gln-Gly-Pro-Lys-Gly-Ser-Arg-Gly-Ser-Pro-Gly-Lys-Pro-Gly-Pro-  
Gln-Gly-Pro-Ser-Gly-Asp-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Lys-Glu-  
10 Gly-Leu-Pro-Gly-Pro-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Phe-Gln-Gly-Leu-Gln-Gly-  
Thr-Val-Gly-Glu-Pro-Gly-Val-Pro-Gly-Pro-Arg-Gly-Leu-Pro-Gly-Leu-  
Pro-Gly-Val-Pro-Gly-Met-Pro-Gly-Pro-Lys-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Pro-  
Gly-Pro-Ser-Gly-Ala-Val-Val-Pro-Leu-Ala-Leu-Gln-Asn-Glu-Pro-Thr-  
Pro-Ala-Pro-Glu-Asp-Asn-Gly-Cys-Pro-Pro-His-Trp-Lys-Asn-Phe-Thr-  
15 Asp-Lys-Cys-Tyr-Tyr-Phe-Ser-Val-Glu-Lys-Glu-Ile-Phe-Glu-Asp-Ala-  
Lys-Leu-Phe-Cys-Glu-Asp-Lys-Ser-Ser-His-Leu-Val-Phe-Ile-Asn-Thr-  
Arg-Glu-Glu-Gln-Gln-Trp-Ile-Lys-Lys-Gln-Met-Val-Gly-Arg-Glu-Ser-  
His-Trp-Ile-Gly-Leu-Thr-Asp-Ser-Glu-Arg-Glu-Asn-Glu-Trp-Lys-Trp-  
Leu-Asp-Gly-Thr-Ser-Pro-Asp-Tyr-Lys-Asn-Trp-Lys-Ala-Gly-Gln-Pro-  
20 Asp-Asn-Trp-Gly-His-Gly-His-Gly-Pro-Gly-Glu-Asp-Cys-Ala-Gly-Leu-  
Ile-Tyr-Ala-Gly-Gln-Trp-Asn-Asp-Phe-Gln-Cys-Glu-Asp-Val-Asn-Asn-  
Phe-Ile-Cys-Glu-Lys-Asp-Arg-Glu-Thr-Val-Leu-Ser-Ser-Ala-Leu (配列番号  
: 2、第229～547位)

からなるタンパク質をコードする塩基配列を含む単離されたポリヌクレオチド

25 。

3. 前記タンパク質が、第一メチオニン残基 (配列番号: 2、第229位) の

上流に以下のアミノ酸配列：

Met-Glu-Glu（配列番号：2、第226～228位）または

Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu（配列番号：2、第211～228位）

- 5 をさらに含む請求の範囲第2項記載のポリヌクレオチド。

4. 前記タンパク質が、第一メチオニン残基（配列番号：2、第229位）の上流に以下のアミノ酸配列：

Met-Glu-Asn-Ile-Thr-Thr-Ile-Ser-Gln-Ala-Asn-Glu-Gln-Asn-Leu-Lys-  
Asp-Leu-Gln-Asp-Leu-His-Lys-Asp-Ala-Glu-Asn-Arg-Thr-Ala-Ile-Lys-  
10 Phe-Asn-Gln-Leu-Glu-Glu-Arg-Phe-Gln-Leu-Phe-Glu-Thr-Asp-Ile-Val-  
Asn-Ile-Ile-Ser-Asn-Ile-Ser-Tyr-Thr-Ala-His-His-Leu-Arg-Thr-Leu-  
Thr-Ser-Asn-Leu-Asn-Glu-Val-Arg-Thr-Thr-Cys-Thr-Asp-Thr-Leu-Thr-  
Lys-His-Thr-Asp-Asp-Leu-Thr-Ser-Leu-Asn-Asn-Thr-Leu-Ala-Asn-Ile-  
Arg-Leu-Asp-Ser-Val-Ser-Leu-Arg-Met-Gln-Gln-Asp-Leu-Met-Arg-Ser-  
15 Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu（配列番号  
：2、第102～228位）、

Met-Asn-Ser-Gln-Leu-Asn-Ser-Phe-Thr-Gly-Gln-Met-Glu-Asn-Ile-Thr-  
Thr-Ile-Ser-Gln-Ala-Asn-Glu-Gln-Asn-Leu-Lys-Asp-Leu-Gln-Asp-Leu-  
His-Lys-Asp-Ala-Glu-Asn-Arg-Thr-Ala-Ile-Lys-Phe-Asn-Gln-Leu-Glu-  
20 Glu-Arg-Phe-Gln-Leu-Phe-Glu-Thr-Asp-Ile-Val-Asn-Ile-Ile-Ser-Asn-  
Ile-Ser-Tyr-Thr-Ala-His-His-Leu-Arg-Thr-Leu-Thr-Ser-Asn-Leu-Asn-  
Glu-Val-Arg-Thr-Thr-Cys-Thr-Asp-Thr-Leu-Thr-Lys-His-Thr-Asp-Asp-  
Leu-Thr-Ser-Leu-Asn-Asn-Thr-Leu-Ala-Asn-Ile-Arg-Leu-Asp-Ser-Val-  
Ser-Leu-Arg-Met-Gln-Gln-Asp-Leu-Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-  
25 Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu（配列番号：2、第91～228位）、  
Met-Asn-Leu-Asn-Asn-Leu-Asn-Leu-Thr-Gln-Val-Gln-Gln-Arg-Asn-Leu-

Ile-Thr-Asn-Leu-Gln-Arg-Ser-Val-Asp-Asp-Thr-Ser-Gln-Ala-Ile-Gln-  
Arg-Ile-Lys-Asn-Asp-Phe-Gln-Asn-Leu-Gln-Gln-Val-Phe-Leu-Gln-Ala-  
Lys-Lys-Asp-Thr-Asp-Trp-Leu-Lys-Glu-Lys-Val-Gln-Ser-Leu-Gln-Thr-  
Leu-Ala-Ala-Asn-Asn-Ser-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Asn-Asn-Asp-Thr-Leu-  
5 Glu-Asp-Met-Asn-Ser-Gln-Leu-Asn-Ser-Phe-Thr-Gly-Gln-Met-Glu-Asn-  
Ile-Thr-Thr-Ile-Ser-Gln-Ala-Asn-Glu-Gln-Asn-Leu-Lys-Asp-Leu-Gln-  
Asp-Leu-His-Lys-Asp-Ala-Glu-Asn-Arg-Thr-Ala-Ile-Lys-Phe-Asn-Gln-  
Leu-Glu-Glu-Arg-Phe-Gln-Leu-Phe-Glu-Thr-Asp-Ile-Val-Asn-Ile-Ile-  
Ser-Asn-Ile-Ser-Tyr-Thr-Ala-His-His-Leu-Arg-Thr-Leu-Thr-Ser-Asn-  
10 Leu-Asn-Glu-Val-Arg-Thr-Thr-Cys-Thr-Asp-Thr-Leu-Thr-Lys-His-Thr-  
Asp-Asp-Leu-Thr-Ser-Leu-Asn-Asn-Thr-Leu-Ala-Asn-Ile-Arg-Leu-Asp-  
Ser-Val-Ser-Leu-Arg-Met-Gln-Gln-Asp-Leu-Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-  
Thr-Glu-Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu (配列番号：2、第9～  
228位)、または  
15 Met-Tyr-Ser-His-Asn-Val-Val-Ile-Met-Asn-Leu-Asn-Asn-Leu-Asn-Leu-  
Thr-Gln-Val-Gln-Gln-Arg-Asn-Leu-Ile-Thr-Asn-Leu-Gln-Arg-Ser-Val-  
Asp-Asp-Thr-Ser-Gln-Ala-Ile-Gln-Arg-Ile-Lys-Asn-Asp-Phe-Gln-Asn-  
Leu-Gln-Gln-Val-Phe-Leu-Gln-Ala-Lys-Lys-Asp-Thr-Asp-Trp-Leu-Lys-  
Glu-Lys-Val-Gln-Ser-Leu-Gln-Thr-Leu-Ala-Ala-Asn-Asn-Ser-Ala-Leu-  
20 Ala-Lys-Ala-Asn-Asn-Asp-Thr-Leu-Glu-Asp-Met-Asn-Ser-Gln-Leu-Asn-  
Ser-Phe-Thr-Gly-Gln-Met-Glu-Asn-Ile-Thr-Thr-Ile-Ser-Gln-Ala-Asn-  
Glu-Gln-Asn-Leu-Lys-Asp-Leu-Gln-Asp-Leu-His-Lys-Asp-Ala-Glu-Asn-  
Arg-Thr-Ala-Ile-Lys-Phe-Asn-Gln-Leu-Glu-Glu-Arg-Phe-Gln-Leu-Phe-  
Glu-Thr-Asp-Ile-Val-Asn-Ile-Ile-Ser-Asn-Ile-Ser-Tyr-Thr-Ala-His-  
25 His-Leu-Arg-Thr-Leu-Thr-Ser-Asn-Leu-Asn-Glu-Val-Arg-Thr-Thr-Cys-  
Thr-Asp-Thr-Leu-Thr-Lys-His-Thr-Asp-Asp-Leu-Thr-Ser-Leu-Asn-Asn-

Thr-Leu-Ala-Asn-Ile-Arg-Leu-Asp-Ser-Val-Ser-Leu-Arg-Met-Gln-Gln-  
Asp-Leu-Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-  
Ile-Met-Glu-Glu (配列番号 : 2、第1~228位)

をさらに含む請求の範囲第2項記載のポリヌクレオチド。

5      5. 以下の塩基配列すなわち、

atgcaacaag atttgatgag gtcgaggtta gacactgaag tagccaactt atcagtgatt  
atggaagaaa tgaagctagt agactccaag catgggtcagc tcatcaagaa ttttacaata  
ctacaaggtc caccgggccc caggggtcca agagggtgaca gaggatccca gggaccccct  
ggcccaactg gcaacaaggg acagaaagga gagaaggggg agcctggacc acctggccct  
10 gcggtgaga gaggcccaat tggaccagct ggtccccccg gagagcgtgg cggcaaagga  
tctaaaggct cccaggggccc caaaggctcc cgtggttccc ctgggaagcc cggccctcag  
ggccccagtg gggaccagg cccccgggc ccaccaggca aagagggact ccccggccct  
cagggccctc ctggcttcca gggacttcag ggcaccgttg gggagcctgg ggtgcctgga  
cctcggggac tgccaggctt gcctggggta ccaggcatgc caggcccca gggccccccc  
15 ggccctcctg gcccatcagg agcgggtggtg cccctggccc tgcagaatga gccaaccccg  
gcaccggagg acaatggctg cccgcctcac tggaagaact tcacagacaa atgctactat  
ttttcagttg agaaagaaat ttttgaggat gcaaagcttt tctgtgaaga caagtcttca  
catcttgttt tcataaacac tagagaggaa cagcaatgga taaaaaaca gatggtaggg  
agagagagcc actggatcgg cctcacagac tcagagcgtg aaaatgaatg gaagtggctg  
20 gatgggacat ctccagacta caaaaattgg aaagctggac agccggataa ctgggggtcat  
ggccatgggc caggagaaga ctgtgctggg ttgatttatg ctgggcagtg gaacgatttc  
caatgtgaag acgtcaataa cttcatttgc gaaaaagaca gggagacagt actgtcatct  
gcatta (配列番号 : 1、第670~1695位)

で示される塩基配列を含む単離されたポリヌクレオチド。

25      6. 以下の塩基配列すなわち、

atgaagctag tagactccaa gcatgggtcag ctcacaaaga attttacaat actacaaggt

ccaccgggcc ccaggggtcc aagaggtgac agaggatccc agggaccccc tggcccaact  
ggcaacaagg gacagaaagg agagaagggg gagcctggac cacctggccc tgcgggtgag  
agaggcccaa ttggaccagc tgggtccccc ggagagcgtg gcggcaaagg atctaaaggc  
tcccagggcc ccaaaggctc ccgtggttcc cctgggaagc ccggccctca gggccccagt  
5 ggggacccag gcccccggg cccaccaggc aaagagggaac tccccggccc tcagggcctt  
cctggcttcc agggacttca gggcaccgtt ggggagcctg gggtgcttg accctgggga  
ctgccaggct tgcctggggg accaggcatg ccaggcccca agggcccccc cggcctcct  
ggcccatcag gagcgggtgt gccctggcc ctgcagaatg agccaacccc ggcaccggag  
gacaatggct gccgcctca ctggaagaac ttcacagaca aatgctacta tttttcagtt  
10 gagaaagaaa tttttgagga tgcaaagctt ttctgtgaag acaagtcttc acatcttggt  
ttcataaaca ctagagagga acagcaatgg ataaaaaac agatggtagg gagagagagc  
cactggatcg gcctcacaga ctgagagcgt gaaaatgaat ggaagtggct ggatgggaca  
tctccagact acaaaaattg gaaagctgga cagccggata actgggggtca tggccatggg  
ccaggagaag actgtgctgg gttgatttat gctgggcagt ggaacgattt ccaatgtgaa  
15 gacgtcaata acttcatttg cgaaaaagac agggagacag tactgtcatc tgcatta

(配列番号 : 1、第739～1695位)

で示される塩基配列を含む単離されたポリヌクレオチド。

7. 前記塩基配列の5'上流に以下の配列すなわち、

atggaagaa (配列番号 : 1、第730～738位) または

20 atgaggtcga ggtagacac tgaagtagcc aacttatcag tgattatgga agaa

(配列番号 : 1、第685～738位)

で示される塩基配列をさらに含む請求の範囲第6項記載のポリヌクレオチド。

8. 前記塩基配列の5'上流に以下の配列すなわち、

atggagaaca tcaccactat ctctcaagcc aacgagcaga acctgaaaga cctgcaggac

25 ttacacaaag atgcagagaa tagaacagcc atcaagttca accaactgga ggaacgcttc

cagctctttg agacggatat tgtgaacatc attagcaata tcagttacac agcccaccac

- ctgcggacgc tgaccagcaa tctaaatgaa gtcaggacca cttgcacaga tacccttacc  
aaacacacag atgatctgac ctccttgaat aataccctgg ccaacatccg ttitgattct  
gtttctctca ggatgcaaca agatttgatg aggtcgaggt tagacactga agtagccaac  
ttatcagtga ttatggaaga a (配列番号：1、第358～738位)、
- 5 atgaacagcc agctcaactc attcacaggt cagatggaga acatcaccac tatctctcaa  
gccaacgagc agaacctgaa agacctgcag gacttacaca aagatgcaga gaatagaaca  
gccatcaagt tcaaccaact ggaggaacgc ttccagctct ttgagacgga tattgtgaac  
atcattagca atatcagtta cacagcccac cacctgcgga cgctgaccag caatctaaat  
gaagtcagga ccacttgac agataccctt accaaacaca cagatgatct gacctccttg  
10 aataataccc tggccaacat ccgtttggat tctgtttctc tcaggatgca acaagatttg  
atgaggtcga ggtagacac tgaagtagcc aacttatcag tgattatgga agaa (配列番  
号：1、第325～738位)、
- atgaacctca acaacctgaa cctgacctag gtgcagcaga ggaacctcat cacgaatctg  
cagcggctctg tggatgacac aagccaggct atccagcgaa tcaagaacga ctttcaaaat  
15 ctgcagcagg tttttcttca agccaagaag gacacggatt ggctgaagga gaaagtgcag  
agcttgacga cgctggctgc caacaactct gcgttggcca aagccaacaa cgacaccctg  
gaggatatga acagccagct caactcattc acaggtcaga tggagaacat caccactatc  
tctcaagcca acgagcagaa cctgaaagac ctgcaggact tacacaaaga tgcagagaat  
agaacagcca tcaagttcaa ccaactggag gaacgcttcc agctctttga gacggatatt  
20 gtgaacatca ttagcaatat cagttacaca gccaccacc tgcggacgct gaccagcaat  
ctaaatgaag tcaggaccac ttgcacagat acccttacca aacacacaga tgatctgacc  
tccttgaata ataccctggc caacatccgt ttggattctg tttctctcag gatgcaacaa  
gatttgatga ggtcgagggt agacactgaa gtagccaact tatcagtgat tatggaagaa  
(配列番号：1、第79～738位)、
- 25 atgtattctc ataatgtggt catcatgaac ctcaacaacc tgaacctgac ccaggtgcag  
cagaggaacc tcatcacgaa tctgcagcgg tctgtggatg acacaagcca ggctatccag

cgaatcaaga acgactttca aaatctgcag caggtttttc ttcaagccaa gaaggacacg  
 gattggctga aggagaaagt gcagagcttg cagacgctgg ctgccaacaa ctctgcgttg  
 gccaaagcca acaacgacac cctggaggat atgaacagcc agctcaactc attcacaggt  
 cagatggaga acatcaccac tatctctcaa gccaacgagc agaacctgaa agacctgcag  
 5 gacttacaca aagatgcaga gaatagaaca gccatcaagt tcaaccaact ggaggaacgc  
 ttccagctct ttgagacgga tattgtgaac atcattagca atatcagtta cacagcccac  
 cacctgcgga cgctgaccag caatctaaat gaagtcagga ccacttgacac agataccctt  
 accaaacaca cagatgatct gacctccttg aataataccc tggccaacat ccgtttggat  
 tctgtttctc tcaggatgca acaagatttg atgaggtcga ggtagacac tgaagtagcc  
 10 aacttatcag tgattatgga agaa (配列番号：1、第55～738位) または、  
 gtcacgaatc tgcagcaaga taccagcgtg ctccagggca atctgcagaa ccaaatgtat  
 tctcataatg tggatcatcat gaacctcaac aacctgaacc tgaccaggt gcagcagagg  
 aacctcatca cgaatctgca gcggtctgtg gatgacacaa gccaggctat ccagcgaatc  
 aagaacgact ttcaaatct gcagcaggtt tttcttcaag ccaagaagga cacggattgg  
 15 ctgaaggaga aagtgcagag cttgcagacg ctggctgcca acaactctgc gttggccaaa  
 gccaaacaacg acaccctgga ggatatgaac agccagctca actcattcac aggtcagatg  
 gagaacatca ccactatctc tcaagccaac gagcagaacc tgaaagacct gcaggactta  
 caciaagatg cagagaatag aacagccatc aagttaacc aactggagga acgcttccag  
 ctctttgaga cggatattgt gaacatcatt agcaatatca gttacacagc ccaccacctg  
 20 cggacgctga ccagcaatct aaatgaagtc aggaccactt gcacagatac ccttacaaa  
 cacacagatg atctgacctc cttgaataat accctggcca acatccgttt ggattctgtt  
 tctctcagga tgcaacaaga tttgatgagg tcgaggtag aactgaagt agccaactta  
 tcagtgatta tggaagaa (配列番号：1、第1～738位)  
 25 で示される塩基配列をさらに含む請求の範囲第6項記載のポリヌクレオチド。

9. 請求の範囲第5項乃至第8項のいずれかに記載のポリヌクレオチドの3'  
 下流に以下の配列すなわち、



taacggactg tgatgggatc acatgagcaa attttcagct ctcaaaggca aaggacactc  
ctttctaatt gcatcacctt ctcatcagat tgaaaaaaaa aaaagcactg aaaaccaatt  
actgaaaaaaaa aattgacagc tagtggtttt taccatccgt cattacccaa agacttgga  
actaaaatgt tccccagggt gatatgctga ttttcattgt gcacatggac tgaatcacat  
5 agattctcct ccgtcagtaa ccgtgcgatt atacaaatta tgtcttccaa agtatggaac  
actccaatca gaaaaaggtt atcatccccg (配列番号：1、1696～2024位) で示さ  
れる塩基配列をさらに含むポリヌクレオチド。

10. 以下の塩基配列すなわち、

caatctgatgagaaggatgatg (配列番号：4) 及び

10 acgaggggctggatgggacat (配列番号：5)

で示される塩基配列を有するプライマーを用いて行ったPCR反応の増幅産物であるプローブと、ストリンジントな条件下でハイブリダイズすることができ、且つ新規コレクチンをコードする単離されたポリヌクレオチド。

11. 請求の範囲第1項乃至第10項のいずれかに記載のポリヌクレオチドと  
15 ストリンジントな条件下でハイブリダイズでき、該ポリヌクレオチドによつてコードされるタンパク質が、(1)  $Ca^{2+}$  要求性の糖認識構造様領域 (CRD)、及び(2) コラーゲン様領域を含む、新規コレクチンであるポリヌクレオチド。

12. 前記ポリヌクレオチドが、cDNAである請求の範囲第1項乃至第11  
20 項のいずれかに記載のポリヌクレオチド。

13. 請求の範囲第5項乃至第12項のいずれかに記載のポリヌクレオチドによつてコードされるアミノ酸配列を含む新規コレクチン。

14. 以下のアミノ酸配列すなわち、

Met-Gln-Gln-Asp-Leu-Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-Val-Ala-Asn-  
25 Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu-Met-Lys-Leu-Val-Asp-Ser-Lys-His-Gly-  
Gln-Leu-Ile-Lys-Asn-Phe-Thr-Ile-Leu-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Arg-

Gly-Pro-Arg-Gly-Asp-Arg-Gly-Ser-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Thr-Gly-  
Asn-Lys-Gly-Gln-Lys-Gly-Glu-Lys-Gly-Glu-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-  
Ala-Gly-Glu-Arg-Gly-Pro-Ile-Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Pro-Gly-Glu-Arg-  
Gly-Gly-Lys-Gly-Ser-Lys-Gly-Ser-Gln-Gly-Pro-Lys-Gly-Ser-Arg-Gly-  
5 Ser-Pro-Gly-Lys-Pro-Gly-Pro-Gln-Gly-Pro-Ser-Gly-Asp-Pro-Gly-Pro-  
Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Lys-Glu-Gly-Leu-Pro-Gly-Pro-Gln-Gly-Pro-Pro-  
Gly-Phe-Gln-Gly-Leu-Gln-Gly-Thr-Val-Gly-Glu-Pro-Gly-Val-Pro-Gly-  
Pro-Arg-Gly-Leu-Pro-Gly-Leu-Pro-Gly-Val-Pro-Gly-Met-Pro-Gly-Pro-  
Lys-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Ser-Gly-Ala-Val-Val-Pro-Leu-  
10 Ala-Leu-Gln-Asn-Glu-Pro-Thr-Pro-Ala-Pro-Glu-Asp-Asn-Gly-Cys-Pro-  
Pro-His-Trp-Lys-Asn-Phe-Thr-Asp-Lys-Cys-Tyr-Tyr-Phe-Ser-Val-Glu-  
Lys-Glu-Ile-Phe-Glu-Asp-Ala-Lys-Leu-Phe-Cys-Glu-Asp-Lys-Ser-Ser-  
His-Leu-Val-Phe-Ile-Asn-Thr-Arg-Glu-Glu-Gln-Gln-Trp-Ile-Lys-Lys-  
Gln-Met-Val-Gly-Arg-Glu-Ser-His-Trp-Ile-Gly-Leu-Thr-Asp-Ser-Glu-  
15 Arg-Glu-Asn-Glu-Trp-Lys-Trp-Leu-Asp-Gly-Thr-Ser-Pro-Asp-Tyr-Lys-  
Asn-Trp-Lys-Ala-Gly-Gln-Pro-Asp-Asn-Trp-Gly-His-Gly-His-Gly-Pro-  
Gly-Glu-Asp-Cys-Ala-Gly-Leu-Ile-Tyr-Ala-Gly-Gln-Trp-Asn-Asp-Phe-  
Gln-Cys-Glu-Asp-Val-Asn-Asn-Phe-Ile-Cys-Glu-Lys-Asp-Arg-Glu-Thr-  
Val-Leu-Ser-Ser-Ala-Leu (配列番号：2、第206～547位)

20 で示されるアミノ酸配列を含む新規コレクチン。

15. 以下のアミノ酸配列すなわち、

Met-Lys-Leu-Val-Asp-Ser-Lys-His-Gly-Gln-Leu-Ile-Lys-Asn-Phe-Thr-  
Ile-Leu-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Arg-Gly-Pro-Arg-Gly-Asp-Arg-Gly-  
Ser-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Thr-Gly-Asn-Lys-Gly-Gln-Lys-Gly-Glu-  
25 Lys-Gly-Glu-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Ala-Gly-Glu-Arg-Gly-Pro-Ile-  
Gly-Pro-Ala-Gly-Pro-Pro-Gly-Glu-Arg-Gly-Gly-Lys-Gly-Ser-Lys-Gly-

Ser-Gln-Gly-Pro-Lys-Gly-Ser-Arg-Gly-Ser-Pro-Gly-Lys-Pro-Gly-Pro-  
 Gln-Gly-Pro-Ser-Gly-Asp-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Pro-Gly-Lys-Glu-  
 Gly-Leu-Pro-Gly-Pro-Gln-Gly-Pro-Pro-Gly-Phe-Gln-Gly-Leu-Gln-Gly-  
 Thr-Val-Gly-Glu-Pro-Gly-Val-Pro-Gly-Pro-Arg-Gly-Leu-Pro-Gly-Leu-  
 5 Pro-Gly-Val-Pro-Gly-Met-Pro-Gly-Pro-Lys-Gly-Pro-Pro-Gly-Pro-Pro-  
 Gly-Pro-Ser-Gly-Ala-Val-Val-Pro-Leu-Ala-Leu-Gln-Asn-Glu-Pro-Thr-  
 Pro-Ala-Pro-Glu-Asp-Asn-Gly-Cys-Pro-Pro-His-Trp-Lys-Asn-Phe-Thr-  
 Asp-Lys-Cys-Tyr-Tyr-Phe-Ser-Val-Glu-Lys-Glu-Ile-Phe-Glu-Asp-Ala-  
 Lys-Leu-Phe-Cys-Glu-Asp-Lys-Ser-Ser-His-Leu-Val-Phe-Ile-Asn-Thr-  
 10 Arg-Glu-Glu-Gln-Gln-Trp-Ile-Lys-Lys-Gln-Met-Val-Gly-Arg-Glu-Ser-  
 His-Trp-Ile-Gly-Leu-Thr-Asp-Ser-Glu-Arg-Glu-Asn-Glu-Trp-Lys-Trp-  
 Leu-Asp-Gly-Thr-Ser-Pro-Asp-Tyr-Lys-Asn-Trp-Lys-Ala-Gly-Gln-Pro-  
 Asp-Asn-Trp-Gly-His-Gly-His-Gly-Pro-Gly-Glu-Asp-Cys-Ala-Gly-Leu-  
 Ile-Tyr-Ala-Gly-Gln-Trp-Asn-Asp-Phe-Gln-Cys-Glu-Asp-Val-Asn-Asn-  
 15 Phe-Ile-Cys-Glu-Lys-Asp-Arg-Glu-Thr-Val-Leu-Ser-Ser-Ala-Leu (配列番号  
 : 2、第229～547位)

で示されるアミノ酸配列を含む新規コレクチン。

16. 前記新規コレクチンが、第一メチオニン残基 (配列番号 : 2、第229位) の上流に以下のアミノ酸配列 :

20 Met-Glu-Glu (配列番号 : 2、第226～228位) または  
 Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-  
 Glu (配列番号 : 2、第211～228位)

をさらに含む請求の範囲第15項記載の新規コレクチン。

17. 前記新規コレクチンが、第一メチオニン残基 (配列番号 : 2、第229位)  
 25 ) の上流に以下のアミノ酸配列 :

Met-Glu-Asn-Ile-Thr-Thr-Ile-Ser-Gln-Ala-Asn-Glu-Gln-Asn-Leu-Lys-

Asp-Leu-Gln-Asp-Leu-His-Lys-Asp-Ala-Glu-Asn-Arg-Thr-Ala-Ile-Lys-  
Phe-Asn-Gln-Leu-Glu-Glu-Arg-Phe-Gln-Leu-Phe-Glu-Thr-Asp-Ile-Val-  
Asn-Ile-Ile-Ser-Asn-Ile-Ser-Tyr-Thr-Ala-His-His-Leu-Arg-Thr-Leu-  
Thr-Ser-Asn-Leu-Asn-Glu-Val-Arg-Thr-Thr-Cys-Thr-Asp-Thr-Leu-Thr-  
5 Lys-His-Thr-Asp-Asp-Leu-Thr-Ser-Leu-Asn-Asn-Thr-Leu-Ala-Asn-Ile-  
Arg-Leu-Asp-Ser-Val-Ser-Leu-Arg-Met-Gln-Gln-Asp-Leu-Met-Arg-Ser-  
Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu (配列番号  
: 2、第102～228位)、  
Met-Asn-Ser-Gln-Leu-Asn-Ser-Phe-Thr-Gly-Gln-Met-Glu-Asn-Ile-Thr-  
10 Thr-Ile-Ser-Gln-Ala-Asn-Glu-Gln-Asn-Leu-Lys-Asp-Leu-Gln-Asp-Leu-  
His-Lys-Asp-Ala-Glu-Asn-Arg-Thr-Ala-Ile-Lys-Phe-Asn-Gln-Leu-Glu-  
Glu-Arg-Phe-Gln-Leu-Phe-Glu-Thr-Asp-Ile-Val-Asn-Ile-Ile-Ser-Asn-  
Ile-Ser-Tyr-Thr-Ala-His-His-Leu-Arg-Thr-Leu-Thr-Ser-Asn-Leu-Asn-  
Glu-Val-Arg-Thr-Thr-Cys-Thr-Asp-Thr-Leu-Thr-Lys-His-Thr-Asp-Asp-  
15 Leu-Thr-Ser-Leu-Asn-Asn-Thr-Leu-Ala-Asn-Ile-Arg-Leu-Asp-Ser-Val-  
Ser-Leu-Arg-Met-Gln-Gln-Asp-Leu-Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-  
Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu (配列番号: 2、第91～228位)、  
Met-Asn-Leu-Asn-Asn-Leu-Asn-Leu-Thr-Gln-Val-Gln-Gln-Arg-Asn-Leu-  
Ile-Thr-Asn-Leu-Gln-Arg-Ser-Val-Asp-Asp-Thr-Ser-Gln-Ala-Ile-Gln-  
20 Arg-Ile-Lys-Asn-Asp-Phe-Gln-Asn-Leu-Gln-Gln-Val-Phe-Leu-Gln-Ala-  
Lys-Lys-Asp-Thr-Asp-Trp-Leu-Lys-Glu-Lys-Val-Gln-Ser-Leu-Gln-Thr-  
Leu-Ala-Ala-Asn-Asn-Ser-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Asn-Asn-Asp-Thr-Leu-  
Glu-Asp-Met-Asn-Ser-Gln-Leu-Asn-Ser-Phe-Thr-Gly-Gln-Met-Glu-Asn-  
Ile-Thr-Thr-Ile-Ser-Gln-Ala-Asn-Glu-Gln-Asn-Leu-Lys-Asp-Leu-Gln-  
25 Asp-Leu-His-Lys-Asp-Ala-Glu-Asn-Arg-Thr-Ala-Ile-Lys-Phe-Asn-Gln-  
Leu-Glu-Glu-Arg-Phe-Gln-Leu-Phe-Glu-Thr-Asp-Ile-Val-Asn-Ile-Ile-

Ser-Asn-Ile-Ser-Tyr-Thr-Ala-His-His-Leu-Arg-Thr-Leu-Thr-Ser-Asn-  
Leu-Asn-Glu-Val-Arg-Thr-Thr-Cys-Thr-Asp-Thr-Leu-Thr-Lys-His-Thr-  
Asp-Asp-Leu-Thr-Ser-Leu-Asn-Asn-Thr-Leu-Ala-Asn-Ile-Arg-Leu-Asp-  
Ser-Val-Ser-Leu-Arg-Met-Gln-Gln-Asp-Leu-Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-  
5 Thr-Glu-Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-Ile-Met-Glu-Glu (配列番号：2、第9～  
228位)、または  
Met-Tyr-Ser-His-Asn-Val-Val-Ile-Met-Asn-Leu-Asn-Asn-Leu-Asn-Leu-  
Thr-Gln-Val-Gln-Gln-Arg-Asn-Leu-Ile-Thr-Asn-Leu-Gln-Arg-Ser-Val-  
Asp-Asp-Thr-Ser-Gln-Ala-Ile-Gln-Arg-Ile-Lys-Asn-Asp-Phe-Gln-Asn-  
10 Leu-Gln-Gln-Val-Phe-Leu-Gln-Ala-Lys-Lys-Asp-Thr-Asp-Trp-Leu-Lys-  
Glu-Lys-Val-Gln-Ser-Leu-Gln-Thr-Leu-Ala-Ala-Asn-Asn-Ser-Ala-Leu-  
Ala-Lys-Ala-Asn-Asn-Asp-Thr-Leu-Glu-Asp-Met-Asn-Ser-Gln-Leu-Asn-  
Ser-Phe-Thr-Gly-Gln-Met-Glu-Asn-Ile-Thr-Thr-Ile-Ser-Gln-Ala-Asn-  
Glu-Gln-Asn-Leu-Lys-Asp-Leu-Gln-Asp-Leu-His-Lys-Asp-Ala-Glu-Asn-  
15 Arg-Thr-Ala-Ile-Lys-Phe-Asn-Gln-Leu-Glu-Glu-Arg-Phe-Gln-Leu-Phe-  
Glu-Thr-Asp-Ile-Val-Asn-Ile-Ile-Ser-Asn-Ile-Ser-Tyr-Thr-Ala-His-  
His-Leu-Arg-Thr-Leu-Thr-Ser-Asn-Leu-Asn-Glu-Val-Arg-Thr-Thr-Cys-  
Thr-Asp-Thr-Leu-Thr-Lys-His-Thr-Asp-Asp-Leu-Thr-Ser-Leu-Asn-Asn-  
Thr-Leu-Ala-Asn-Ile-Arg-Leu-Asp-Ser-Val-Ser-Leu-Arg-Met-Gln-Gln-  
20 Asp-Leu-Met-Arg-Ser-Arg-Leu-Asp-Thr-Glu-Val-Ala-Asn-Leu-Ser-Val-  
Ile-Met-Glu-Glu (配列番号：2、第1～228位)

をさらに含む請求の範囲第15項記載の新規コレクティン。

18. 前記新規コレクティンが、ヒト由来の新規コレクティンである請求の範囲第13項乃至第17項のいずれかに記載の新規コレクティン。

25 19. 請求の範囲第13項乃至第18項のいずれかに記載の新規コレクティンのアミノ酸配列において、1または複数のアミノ酸が欠失、置換及び／または付

加されたアミノ酸配列からなり、且つ、（１） $\text{Ca}^{2+}$ 要求性の糖認識構造様領域（CRD）、及び（２）コラーゲン様領域を含むことを特徴とする新規コレクチン。

20. 請求の範囲第1乃至12項のいずれかに記載のポリヌクレオチドを、新規コレクチンの発現を許容するように含むベクター。

21. 請求の範囲第20項記載のベクターを発現可能に含む宿主細胞。

22. 請求の範囲第1乃至12項のいずれかに記載のポリヌクレオチドまたはその断片を含む、新規コレクチン関連分子種をスクリーニングするためのプローブ。

23. 請求の範囲第13乃至19項のいずれかに記載の新規コレクチンに対して特異的な免疫反応性を有する抗体。

24. モノクローナル抗体である請求の範囲第23項記載の抗体。

25. ヒトに対する免疫原性を低下させた請求の範囲第23または24項記載の抗体。

26. 新規コレクチン関連分子種を取得するための方法であって、請求の範囲第23乃至25項のいずれかに記載の抗体を使用してタンパク質をスクリーニングする工程を含むことを特徴とする方法。

27. 新規コレクチン及び／または由来分子を取得するための方法であって、請求の範囲第23乃至25項のいずれかに記載の抗体を使用してタンパク質をスクリーニングする工程を含むことを特徴とする方法。

28. 前記スクリーニングが、cDNAライブラリーの発現スクリーニングである請求の範囲第26または27項記載の方法。

29. 新規コレクチン及び／または由来分子の定量方法であって、請求の範囲第23乃至25項のいずれかに記載の抗体を使用して、被検試料中に含まれる新規コレクチン及び／または由来分子の量を測定することを特徴とする定量方法。

30. 前記抗体が、E L I S A法において使用される請求の範囲第29項記載の定量方法。

31. 新規コレクチン及び／または由来分子を定量するためのキットであって、請求の範囲第23乃至25項のいずれかに記載の抗体を含み、該抗体を用いたE L I S A法によって被検試料中に含まれる新規コレクチン及び／または由来分子の量が測定されることを特徴とするキット。

32. 新規コレクチン及び／または由来分子を取得するための方法であって、請求の範囲第23乃至25項のいずれかに項記載の抗体を用いて新規コレクチン及び／または由来分子を単離する工程を含む方法。

33. 前記単離工程において、前記抗体を結合させた担体によるアフィニティークロマトグラフィーおよび／または免疫沈降が用いられる請求の範囲第32項記載の方法。

34. 請求の範囲第1乃至12項のいずれかに記載のポリヌクレオチドより新規コレクチンを発現させる工程を前記単離工程の前に含む請求の範囲第32または33項記載の方法。

35. 請求の範囲第1乃至12項のいずれかに記載のポリヌクレオチドを含む組換え遺伝子が安定して染色体に導入され、且つ新規コレクチンを発現することができることを特徴とするトランスジェニック非ヒト動物。

36. 請求の範囲第13乃至19項記載のいずれかに記載の新規コレクチンの相同体を含む非ヒト動物において、該相同体をコードする遺伝子の発現を修飾するように遺伝子導入がなされたことを特徴とするトランスジェニック非ヒト動物。


37. 請求の範囲第13乃至19項記載のいずれかに記載の新規コレクチンの相同体を含む非ヒト動物において、該相同体の発現を阻止するように該相同体をコードする遺伝子が改変されて得られることを特徴とするノックアウト非ヒト動物。





第1図

1/11





第2圖

$$\frac{2}{11}$$

```

tMBP      MSLFPS-LpLLLSMVAASVSETVTCEDAQKI---CPAVIACSS--PGINOPPKRGGRDGTKEKEGEPG
tSP-A     MWLCPALITILMA---ASGAACEVKDVCV-----GSPG
tSP-D     MLLFLL-SALVLLIQ-PLQYLEAEMKTYSHRTTPSACTLV-MCSSVESQLPQRDGRDGRGPRGKEKDDPG
70
tMBP      IPGTPCSSHLPGRDGR-----DGVKGDPPGPPGMQPPG-----ENP
tSP-A     LPGAAGQAGMPGQAGPVQPKDNGSVGEPGPKODITGSPGPPGPPGVPGPAGREGLKQKGNIGPQGKPPG
140
tSP-D     QGLRGLQGP-----PQMLQPPGNEPQPSGSPQPKQK
tSP-A     CLPGNNGLPGAPGVPGE-----RGEKGEPPGERGPPGL
tSP-D     KGEAGPKGEVQAPQMGGSAQARGLAQPKGERGVPGERGVPGNAGAGSAQAMQPGSPGARGPPOLKGDK
210

```



第 3 図

```

tMBP      G D P G - K S P D G D S S L A A - - - - - S E R K A L Q T E M A R I K K W L T F S L G K Q V G N K F E L T N G E I M T F E K V
tSP-A      - - P A H L D E E L Q A T L H D - - - - - F R H Q I L Q T R G A L S - L Q G S I - - - - - M T V G E K V F S S N Q Q S I T F D A I
tSP-D      G I P G D K G A K G E S G L P D V A S L R Q Q V E A L Q G Q V Q H L Q A A F S Q Y K R V E L F P N Q Q S V G E K I F K T A G F V K P F T E A   280

K A L C V K F Q A S V A T P R N A A E N G A I O N L I - - - K E E A F L G I T D E K T E G Q F V D L T G N R L T Y T N W N E G E P N V A G S
Q E A C A R A G G R I A M P R N P E N E A I A S F V K K Y N I T Y A V V Q L T E G P S P O D E R Y S D G T P V N Y T N W Y R G E P A G R G -
Q L L C T Q A G G Q L A S P R S A A E N A A L Q Q L V V A K N E A A F L S M T D S K T E C K F I T Y P T G E S L V Y S N W A P G E P N D D G G   350


D E T C W L L L R N G L W N D Y G C S T S H L R V G E F P I *
R E Q C V E M Y T D Q W N D R N C L Y S R L I C E F - - -
S E D C V E I F I N G K W N D R A C G E K R L V C E F * - -

```



第 4 図

4/11











~~6/11~~

280

350

```


--ACSDEDCVLLKNGOWNDVPCSTSHLAVCFPPI*-----
--RC-KEQQVEMYTDGOWNDRNCLYSRLTCDDF*-----
--DGSEDCVEFTNKMNDRACGEKRLVVCF*-----
HGHCPEDCAGLIYAGOWNDFQEDVNNFICEKORETVLSSAL*

```



第7図


7/11





第 8 図

8/11









第9図

9/11






第 10 図

10  
/ 11



第 11 図

11/11





## SEQUENCE LISTING

<110> FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.

<120> Novel Collectin

<130> 99P147W0

<150> JP 10-237611

<151> 1998-08-24

<160> 29

<210> 1

<211> 2024

<212> DNA

<213> Homo Sapiens

<220>

<221> CDS

<222> (670).. (1695)

<400> 1

gtcacgaatc tgcagcaaga taccagcgtg ctccagggca atctgcagaa ccaaattgtat	60
tctcataatg tggatcatcat gaacctcaac aacctgaacc tgacccaggt gcagcagagg	120
aacctcatca cgaatctgca gcggtctgtg gatgacacaa gccaggctat ccagcgaatc	180
aagaacgact ttcaaaatct gcagcaggtt ttctttcaag ccaagaagga cacggattgg	240
ctgaaggaga aagtgcagag cttgcagacg ctggctgcca acaactctgc gttggccaaa	300
gccacaacg acaccctgga ggatatgaac agccagctca actcattcac aggtcagatg	360





gagaacatca ccactatctc tcaagccaac gagcagaacc tgaaagacct gcaggactta 420  
 cacaagatg cagagaatag aacagccatc aagticaacc aactggagga acgcttccag 480  
 ctctttgaga cggatatgtg gaacatcatt agcaatatca gttacacagc ccaccacctg 540  
 cggacgctga ccagcaatct aaatgaagtc aggaccactt gcacagatac ccttaccaaa 600  
 cacacagatg atctgacctc cttgaataat accctggcca acatccgttt ggattctgtt 660  
 tctctcagg atg caa caa gat ttg atg agg tcg agg tta gac act gaa gta 711  
 Met Gln Gln Asp Leu Met Arg Ser Arg Leu Asp Thr Glu Val  
 1 5 10  
 gcc aac tta tca gtg att atg gaa gaa atg aag cta gta gac tcc aag 759  
 Ala Asn Leu Ser Val Ile Met Glu Glu Met Lys Leu Val Asp Ser Lys  
 15 20 25 30  
 cat ggt cag ctc atc aag aat ttt aca ata cta caa ggt cca ccg ggc 807  
 His Gly Gln Leu Ile Lys Asn Phe Thr Ile Leu Gln Gly Pro Pro Gly  
 35 40 45  
 ccc agg ggt cca aga ggt gac aga gga tcc cag gga ccc cct ggc cca 855  
 Pro Arg Gly Pro Arg Gly Asp Arg Gly Ser Gln Gly Pro Pro Gly Pro  
 50 55 60  
 act ggc aac aag gga cag aaa gga gag aag ggg gag cct gga cca cct 903  
 Thr Gly Asn Lys Gly Gln Lys Gly Glu Lys Gly Glu Pro Gly Pro Pro  
 65 70 75  
 ggc cct gcg ggt gag aga ggc cca att gga cca gct ggt ccc ccc gga 951  
 Gly Pro Ala Gly Glu Arg Gly Pro Ile Gly Pro Ala Gly Pro Pro Gly  
 80 85 90  
 gag cgt ggc ggc aaa gga tct aaa ggc tcc cag ggc ccc aaa ggc tcc 999  
 Glu Arg Gly Gly Lys Gly Ser Lys Gly Ser Gln Gly Pro Lys Gly Ser  
 95 100 105 110  
 cgt ggt tcc cct ggg aag ccc ggc cct cag ggc ccc agt ggg gac cca 1047  
 Arg Gly Ser Pro Gly Lys Pro Gly Pro Gln Gly Pro Ser Gly Asp Pro  
 115 120 125



ggc ccc ccg ggc cca cca ggc aaa gag gga ctc ccc ggc cct cag ggc 1095  
 Gly Pro Pro Gly Pro Pro Gly Lys Glu Gly Leu Pro Gly Pro Gln Gly  
                   130                  135                  140  
 cct cct ggc ttc cag gga ctt cag ggc acc gtt ggg gag cct ggg gtg 1143  
 Pro Pro Gly Phe Gln Gly Leu Gln Gly Thr Val Gly Glu Pro Gly Val  
                   145                  150                  155  
 cct gga cct cgg gga ctg cca ggc ttg cct ggg gta cca ggc atg cca 1191  
 Pro Gly Pro Arg Gly Leu Pro Gly Leu Pro Gly Val Pro Gly Met Pro  
                   160                  165                  170  
 ggc ccc aag ggc ccc ccc ggc cct cct ggc cca tca gga gcg gtg gtg 1239  
 Gly Pro Lys Gly Pro Pro Gly Pro Pro Gly Pro Ser Gly Ala Val Val  
                   175                  180                  185                  190  
 ccc ctg gcc ctg cag aat gag cca acc ccg gca ccg gag gac aat ggc 1287  
 Pro Leu Ala Leu Gln Asn Glu Pro Thr Pro Ala Pro Glu Asp Asn Gly  
                   195                  200                  205  
 tgc ccg cct cac tgg aag aac ttc aca gac aaa tgc tac tat ttt tca 1335  
 Cys Pro Pro His Trp Lys Asn Phe Thr Asp Lys Cys Tyr Tyr Phe Ser  
                   210                  215                  220  
 gtt gag aaa gaa att ttt gag gat gca aag ctt ttc tgt gaa gac aag 1383  
 Val Glu Lys Glu Ile Phe Glu Asp Ala Lys Leu Phe Cys Glu Asp Lys  
                   225                  230                  235  
 tct tca cat ctt gtt ttc ata aac act aga gag gaa cag caa tgg ata 1431  
 Ser Ser His Leu Val Phe Ile Asn Thr Arg Glu Glu Gln Gln Trp Ile  
                   240                  245                  250  
 aaa aaa cag atg gta ggg aga gag agc cac tgg atc ggc ctc aca gac 1479  
 Lys Lys Gln Met Val Gly Arg Glu Ser His Trp Ile Gly Leu Thr Asp  
                   255                  260                  265                  270  
 tca gag cgt gaa aat gaa tgg aag tgg ctg gat ggg aca tct cca gac 1527  
 Ser Glu Arg Glu Asn Glu Trp Lys Trp Leu Asp Gly Thr Ser Pro Asp



4/17

	275	280	285	
tac aaa aat tgg aaa gct gga cag ccg gat aac tgg ggt cat ggc cat				1575
Tyr Lys Asn Trp Lys Ala Gly Gln Pro Asp Asn Trp Gly His Gly His				
	290	295	300	
ggg cca gga gaa gac tgt gct ggg ttg att tat gct ggg cag tgg aac				1623
Gly Pro Gly Glu Asp Cys Ala Gly Leu Ile Tyr Ala Gly Gln Trp Asn				
	305	310	315	
gat ttc caa tgt gaa gac gtc aat aac ttc att tgc gaa aaa gac agg				1671
Asp Phe Gln Cys Glu Asp Val Asn Asn Phe Ile Cys Glu Lys Asp Arg				
	320	325	330	
gag aca gta ctg tca tct gca tta taacggactg tgatgggatac acatgagcaa				1725
Glu Thr Val Leu Ser Ser Ala Leu				
	335	340		
attttcagct ctcaaaggca aaggacactc ctttctaatt gcatcacctt ctcacatgat				1785
tgaaaaaaaaaaa aaagcactg aaaaccaatt actgaaaaaaaa aattgacagc tagtggtttt				1845
taccatccgt cattacccaa agacttggga actaaaatgt tccccagggt gatatgctga				1905
ttttcattgt gcacatggac tgaatcacat agattctcct ccgtcagtaa ccgtgcgatt				1965
atacaaatta tgtcttccaa agtatggaac actccaatca gaaaaagggtt atcatcccg				2024

&lt;210&gt; 2

&lt;211&gt; 547

&lt;212&gt; PRT

&lt;213&gt; Homo Sapiens

&lt;220&gt;

<223> Deduced Amino Acid Sequence of Novel Collectin from Nucleotide Sequence.

&lt;400&gt; 2



5/17

Met Tyr Ser His Asn Val Val Ile Met Asn Leu Asn Asn Leu Asn Leu  
 1 5 10 15  
 Thr Gln Val Gln Gln Arg Asn Leu Ile Thr Asn Leu Gln Arg Ser Val  
 20 25 30  
 Asp Asp Thr Ser Gln Ala Ile Gln Arg Ile Lys Asn Asp Phe Gln Asn  
 35 40 45  
 Leu Gln Gln Val Phe Leu Gln Ala Lys Lys Asp Thr Asp Trp Leu Lys  
 50 55 60  
 Glu Lys Val Gln Ser Leu Gln Thr Leu Ala Ala Asn Asn Ser Ala Leu  
 65 70 75 80  
 Ala Lys Ala Asn Asn Asp Thr Leu Glu Asp Met Asn Ser Gln Leu Asn  
 85 90 95  
 Ser Phe Thr Gly Gln Met Glu Asn Ile Thr Thr Ile Ser Gln Ala Asn  
 100 105 110  
 Glu Gln Asn Leu Lys Asp Leu Gln Asp Leu His Lys Asp Ala Glu Asn  
 115 120 125  
 Arg Thr Ala Ile Lys Phe Asn Gln Leu Glu Glu Arg Phe Gln Leu Phe  
 130 135 140  
 Glu Thr Asp Ile Val Asn Ile Ile Ser Asn Ile Ser Tyr Thr Ala His  
 145 150 155 160  
 His Leu Arg Thr Leu Thr Ser Asn Leu Asn Glu Val Arg Thr Thr Cys  
 165 170 175  
 Thr Asp Thr Leu Thr Lys His Thr Asp Asp Leu Thr Ser Leu Asn Asn  
 180 185 190  
 Thr Leu Ala Asn Ile Arg Leu Asp Ser Val Ser Leu Arg Met Gln Gln  
 195 200 205  
 Asp Leu Met Arg Ser Arg Leu Asp Thr Glu Val Ala Asn Leu Ser Val  
 210 215 220  
 Ile Met Glu Glu Met Lys Leu Val Asp Ser Lys His Gly Gln Leu Ile





6/17

225                      230                      235                      240  
Lys Asn Phe Thr Ile Leu Gln Gly Pro Pro Gly Pro Arg Gly Pro Arg  
                         245                      250                      255  
Gly Asp Arg Gly Ser Gln Gly Pro Pro Gly Pro Thr Gly Asn Lys Gly  
                         260                      265                      270  
Gln Lys Gly Glu Lys Gly Glu Pro Gly Pro Pro Gly Pro Ala Gly Glu  
                         275                      280                      285  
Arg Gly Pro Ile Gly Pro Ala Gly Pro Pro Gly Glu Arg Gly Gly Lys  
                         290                      295                      300  
Gly Ser Lys Gly Ser Gln Gly Pro Lys Gly Ser Arg Gly Ser Pro Gly  
305                      310                      315                      320  
Lys Pro Gly Pro Gln Gly Pro Ser Gly Asp Pro Gly Pro Pro Gly Pro  
                         325                      330                      335  
Pro Gly Lys Glu Gly Leu Pro Gly Pro Gln Gly Pro Pro Gly Phe Gln  
                         340                      345                      350  
Gly Leu Gln Gly Thr Val Gly Glu Pro Gly Val Pro Gly Pro Arg Gly  
                         355                      360                      365  
Leu Pro Gly Leu Pro Gly Val Pro Gly Met Pro Gly Pro Lys Gly Pro  
                         370                      375                      380  
Pro Gly Pro Pro Gly Pro Ser Gly Ala Val Val Pro Leu Ala Leu Gln  
385                      390                      395                      400  
Asn Glu Pro Thr Pro Ala Pro Glu Asp Asn Gly Cys Pro Pro His Trp  
                         405                      410                      415  
Lys Asn Phe Thr Asp Lys Cys Tyr Tyr Phe Ser Val Glu Lys Glu Ile  
                         420                      425                      430  
Phe Glu Asp Ala Lys Leu Phe Cys Glu Asp Lys Ser Ser His Leu Val  
                         435                      440                      445  
Phe Ile Asn Thr Arg Glu Glu Gln Gln Trp Ile Lys Lys Gln Met Val  
                         450                      455                      460



7/17

Gly Arg Glu Ser His Trp Ile Gly Leu Thr Asp Ser Glu Arg Glu Asn  
 465                      470                      475                      480  
 Glu Trp Lys Trp Leu Asp Gly Thr Ser Pro Asp Tyr Lys Asn Trp Lys  
                          485                      490                      495  
 Ala Gly Gln Pro Asp Asn Trp Gly His Gly His Gly Pro Gly Glu Asp  
                          500                      505                      510  
 Cys Ala Gly Leu Ile Tyr Ala Gly Gln Trp Asn Asp Phe Gln Cys Glu  
                          515                      520                      525  
 Asp Val Asn Asn Phe Ile Cys Glu Lys Asp Arg Glu Thr Val Leu Ser  
                          530                      535                      540  
 Ser Ala Leu  
 545

&lt;210&gt; 3

&lt;211&gt; 27

&lt;212&gt; PRT

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

<223> Modified Consensus Sequence of collectins Hybridizable with Novel  
 Collectin.

&lt;400&gt; 3

Glu Lys Cys Val Glu Met Tyr Thr Asp Gly Lys Trp Asn Asp Arg Asn  
     1                      5                      10                      15  
 Cys Leu Gln Ser Arg Leu Ala Ile Cys Glu Phe  
                          20                      25

&lt;210&gt; 4



8/17

&lt;211&gt; 21

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Sequence of a Reverse Primer for Screening a Novel Collectin.

&lt;400&gt; 4

caatctgatg agaaggtgat g

21

&lt;210&gt; 5

&lt;211&gt; 21

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Sequence of a Forward Primer for Screening a Novel Collectin.

&lt;400&gt; 5

acgaggggct ggatgggaca t

21

&lt;210&gt; 6

&lt;211&gt; 27

&lt;212&gt; PRT

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Consensus sequence of three collectins which were reported heretofore.



9/17

&lt;400&gt; 6

Glu Asp Cys Val Leu Leu Leu Lys Asn Gly Gln Trp Asn Asp Val Pro

1

5

10

15

Cys Ser Thr Ser His Leu Ala Val Cys Glu Phe

20

25

&lt;210&gt; 7

&lt;211&gt; 24

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; M13 Universal Primer Sequence for Sequencing.

&lt;400&gt; 7

cgacgttgta aaacgacggc cagt

24

&lt;210&gt; 8

&lt;211&gt; 17

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; M13 Reverse Primer Sequence for Sequencing.

&lt;400&gt; 8

caggaaaca gctatgac

17





10/17

&lt;210&gt; 9

&lt;211&gt; 24

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

<223> Sequence of a  $\lambda$ gt11 Reverse Primer for Sequencing.

&lt;400&gt; 9

ttgacaccag accaactggt aatg

24

&lt;210&gt; 10

&lt;211&gt; 24

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

<223> Sequence of a  $\lambda$ gt11 Forward Primer for Sequencing.

&lt;400&gt; 10

ggtggcgacg actcctggag cccg

24

&lt;210&gt; 11

&lt;211&gt; 21

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Sequence of a Primer for Screening a Novel Collectin.



11/17

&lt;400&gt; 11

cgtgaaaatg aatggaagtg g

21

&lt;210&gt; 12

&lt;211&gt; 21

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Sequence of a Primer for Screening a Novel Collectin.

&lt;400&gt; 12

ttttatccat tgctgttcct c

21

&lt;210&gt; 13

&lt;211&gt; 21

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial Sequence

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Sequence of a Primer for Sequencing a Novel Collectin.

&lt;400&gt; 13

ctggcagtcc ccgaggtcca g

21

&lt;210&gt; 14

&lt;211&gt; 21

&lt;212&gt; DNA



12/17

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Primer for Sequencing a Novel Collectin.

<400> 14

gctggtcccc ccggagagcg t

21

<210> 15

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a lRC2 Primer for Cap Site Sequencing.

<400> 15

caaggtacgc cacagcgat g

21

<210> 16

<211> 20

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Synthetic TGP1 Primer for Cap Site Sequencing.

<400> 16

tcttcagttt ccctaattccc

20



<210> 17

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a 2RC2 Primer for Cap Site Sequencing.

<400> 17

gtacgccaca gcgtatgatg c

21

<210> 18

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Synthetic TGP2 Primer for Cap Site Sequencing.

<400> 18

cattcttgac aaacttcata g

21

<210> 19

<211> 22

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>





14/17

<223> Sequence of a Primer for Screening a Novel Collectin.

<400> 19

gaagacaagt cttcaactct tg

22

<210> 20

<211> 22

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Primer for Screening a Novel Collectin.

<400> 20

ctctgagtct gtgaggccga tc

22

<210> 21

<211> 111

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Probe for Screening a Novel Collectin.

<400> 21

gaagacaagt cttcacatct tgttttcata aacactagag aggaacagca atggataaaa

60

aaacagatgg tagggagaga gagccactgg atcggcctca cagactcaga g

111

<210> 22



<211> 22

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Forward Primer for Screening a Novel Collectin.

<400> 22

gtgcccctgg ccctgcagaa tg

22

<210> 23

<211> 26

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Reverse Primer for Screening a Novel Collectin.

<400> 23

gcatatcacc ctggggaaca ttttag

26

<210> 24

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Sense Primer for Screening  $\beta$ -Actin.



<400> 24

caagagatgg ccacggctgc t

21

<210> 25

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of an Antisense Primer for Screening  $\beta$ -Actin.

<400> 25

tccttctgca tcctgtcggc a

21

<210> 26

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Sense Primer for Amplifying the Novel Collectin.

<400> 26

aaggaaaaaa gcggccgcat gcaacaagat ttgatgagg

39

<210> 27

<211> 29

<212> DNA

<213> Artificial Sequence



<220>

<223> Sequence of a Reverse Primer for Amplifying the Novel Collectin.

<400> 27

gctctagatt ataatgcaga tgacagtac

29

<210> 28

<211> 21

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Sense Primer for Amplifying the Nockout Gene.

<400> 28

atgcaacaag atttgatgag g

21

<210> 29

<211> 20

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Sequence of a Sense Primer for Amplifying the Nockout Gene.

<400> 29

cctacccggt agaattgacc

20





REC'D 03 OCT 2000

WIPO PCT


PCT


国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 99P147WO	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 99/04552	国際出願日 (日.月.年) 24.08.99	優先日 (日.月.年) 24.08.98
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 5/10, C12P 21/02, C07K 16/18, C12P 21/08, G01N 33/53, A01K 67/027 // (C12N 5/10, C12R 1:91), (C12P 21/02, C12R 1:91), (C12P 21/02, C12R 1:91)		
出願人 (氏名又は名称) 扶桑薬品工業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。  <input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。  I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎  II <input type="checkbox"/> 優先権  III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成  IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如  V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明  VI <input checked="" type="checkbox"/> ある種の引用文献  VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備  VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 12.01.00	国際予備審査報告を作成した日 13.09.00	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)  齋藤 真由美 	4 B 8931  電話番号 03-3581-1101 内線 3448



## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT 14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT 19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☒ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☒ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)



## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-37	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲	1-37	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-37	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: Eur. J. Immunol. (1992), Vol. 22, p. 1437-1445

文献2: Biochemical and Biophysical Research Communications (1993),  
Vol. 191, No. 2, p. 335-342

文献3: JP, 9-238683, A (株式会社エイジーン研究所) 16.9月.1997 (16.09.97)

請求の範囲1~37に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1~3に対して進歩性を有する。文献1~3には配列番号1に記載の塩基配列又は配列番号2のアミノ酸配列からなるタンパクをコードする塩基配列を含むポリヌクレオチド、プローブ、ベクター、形質転換体(トランスジェニック非ヒト動物を含む)、該タンパク質、それに対応する抗体、スクリーニング方法が記載されておらず、しかもその点は文献1~3から当業者といえども容易に想到し得ないものである。



## VI. ある種の引用文献

## 1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
PCT/US98/1210	10. 12. 98	01. 06. 98	04. 06. 97 29. 05. 98

## 2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)
-----------------	------------------------------	--

